

Figure 1.3 En Afrique subsaharienne, les jeunes femmes sont plus vulnérables face à l'infection par le VIH que les jeunes hommes, mais disposent d'une information moins complète qu'eux sur le VIH


Jeunes (âgés de 15 à 24 ans) de certains pays d'Afrique subsaharienne qui disposent d'une information complète sur le VIH, 1999-2005*

■ Femmes
■ Hommes

Note : pays choisis sur la base des données disponibles concernant la prévalence du VIH et de l'information complète dont disposent à la fois les jeunes hommes et les jeunes femmes sur le VIH.

* Les données concernent l'année la plus récente de la période considérée pour laquelle on dispose de données.

Sources : enquêtes démographiques et sanitaires, enquêtes en grappes à indicateurs multiples, enquêtes sur le comportement, enquêtes sur la santé en matière de procréation et *HIV/AIDS Survey Indicators Database*. Les données utilisées sont présentées dans les tableaux statistiques du présent rapport, page 98.



Prévalence du VIH parmi les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) dans certains pays d'Afrique subsaharienne, 2005

■ Femmes
■ Hommes

Note : pays choisis sur la base des données disponibles concernant la prévalence du VIH et de l'information complète dont disposent à la fois les jeunes hommes et les jeunes femmes sur le VIH.

Source : Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, *Rapport de 2006 sur l'épidémie mondiale de SIDA*, ONUSIDA, Genève, 2006. Les données utilisées sont présentées dans les tableaux statistiques du présent rapport, page 98.

