

Causes sous-jacentes et structurelles de la mortalité maternelle et infantile

La mortalité et la malnutrition des mères, des nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans ont plusieurs causes communes interdépendantes et structurelles, telles que :

- Services de santé et de nutrition manquant de ressources, amorphes et mal adaptés à la culture locale.
- Insécurité alimentaire.
- Pratiques alimentaires inadéquates.
- Manque d'hygiène et d'accès à l'eau salubre ou à des moyens d'assainissement.
- Analphabétisme des femmes.
- Grossesses précoces.
- Discrimination et exclusion des mères et des enfants s'agissant de l'accès aux services de santé et de nutrition, cette marginalisation tenant à leur pauvreté ou à des raisons géographiques ou politiques.

Chaque année, ces causes sont à l'origine de millions de décès qui pourraient être évités. Étant donné qu'elles sont étroitement imbriquées, il faut s'y attaquer à différents

niveaux - au sein de la communauté et de la famille, au niveau des prestataires de services, du gouvernement et au plan international - dans le cadre d'une approche intégrée afin d'accroître l'efficacité et la portée des interventions.

Les solutions sont bien connues, notamment en ce qui concerne les causes directes des décès maternels, néonataux et infantiles. Les interventions nécessaires consistent notamment à offrir un ensemble de soins de santé primaire essentiels - des services de soins pour les enfants assurés grâce à un *continuum de soins* couvrant la grossesse, l'accouchement et au-delà, ainsi que les premières années cruciales de la vie (*voir Encadré, page 17, pour une définition complète de la notion de continuum de soins*).

Voir Références, page 104.