


Les enfants ruraux ont moins de chances d'être traités en cas d'IRA

Pourcentage d'enfants atteints d'infections respiratoires aiguës traités par un pourvoyeur de soins*, par lieu de résidence



Source pour les graphiques et les cartes : UNICEF, 2001

Objectif

Diminution de 50 % du nombre de décès dus à des IRA parmi les moins de 5 ans


» Infections respiratoires aiguës



Trop peu d'enfants sont traités en cas d'IRA

Pourcentage d'enfants atteints d'IRA traités par un pourvoyeur de soins, 1900-2000

60 %+ 40-59 % 20-39 % 0-19 % Pas de données



Résultats

L'initiative Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, lancée en 1992, ainsi que d'autres programmes de santé basés sur la communauté, forment les personnels de santé à reconnaître les signes d'une infection respiratoire aiguë et à avoir recours à un traitement opportun en dehors du foyer.

Mais...


Dans plus de 40 des 82 pays pour lesquels on dispose de données, moins de 50 % des enfants atteints d'infections respiratoires aiguës ont été traités par un pourvoyeur de soins. La disponibilité des pourvoyeurs de soins et l'accès à des services de santé appropriés, ainsi qu'aux antibiotiques, doivent aussi être améliorés dans de nombreux pays.

Défi à relever

Les infections respiratoires aiguës sont l'une des principales causes de décès des enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement. La pneumonie est la plus grave de ces infections, mais elle peut souvent être traitée à l'aide d'antibiotiques bon marché. Lorsqu'un enfant montre les signes d'une infection respiratoire aiguë (toux accompagnée d'une respiration courte et rapide), il doit recevoir immédiatement les soins appropriés.

Différences régionales du recours à des soins médicaux pour les enfants

Variations régionales et internationales en matière de promotion du recours opportun à des soins médicaux pour les enfants atteints d'IRA



Les deux points de données pour chaque région indiquent la proportion la plus faible et la plus élevée d'enfants atteints d'IRA traités par un pourvoyeur de soins.

*Les pourvoyeurs de soins comprennent les hôpitaux, les centres de santé, les dispensaires, les agents de santé des villages, les maternités et cliniques pour enfants, les hôpitaux mobiles/de campagne et les médecins privés. Dans 15 pays (principalement en Amérique latine et au Moyen-Orient), les pharmacies font aussi partie des pourvoyeurs de soins.