

Objectif

Diminution de 50 % du nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans dus à la diarrhée et de 25 % du taux d'incidence de la maladie

» Maladies diarrhéiques



Résultats

Au début de la décennie, la diarrhée était considérée comme la principale cause de décès chez les enfants de moins de cinq ans. En 2000, l'objectif a été atteint et le nombre de décès imputables à la diarrhée a diminué de moitié. Selon les estimations, plus d'1 million de décès d'enfants par an auraient pu être évités. Ce succès est attribuable à la promotion et à l'utilisation de la thérapeutique de réhydratation orale.

Mais...

Malgré les progrès accomplis, la diarrhée reste une cause majeure de mortalité infantile. Pour continuer à réduire le nombre de décès d'enfants dus à cette maladie, les familles doivent être mieux informées et avoir recours aux traitements administrés à la maison qui permettent de la soigner efficacement. Les enfants plus gravement atteints doivent avoir accès à des soins de santé adéquats. De même, l'approvisionnement en eau propre et l'assainissement doivent être améliorés.


Défi à relever

La plupart des décès causés par la diarrhée se produisent par déshydratation, ou perte excessive d'eau et de sel dans l'organisme. La thérapeutique de réhydratation orale permet de sauver de nombreuses vies.

IMPORTANTES PROGRES REALISES

Le recours à la TRO a augmenté ou s'est maintenu dans un grand nombre de pays, 1990-2000


Source : UNICEF, 2001.



Traitement de la diarrhée à grande échelle

Pourcentage d'enfants atteints de diarrhée traités par la TRO*, 1990-2000**

Source : UNICEF, 2001.



*Le recours à la TRO est mesuré dans chaque pays à partir du pourcentage le plus élevé de trois indicateurs spécifiques : QLA/AC, SRO seulement, et TRO ou solutions sel-sucre
**Enfants ayant été traités par la TRO dans les deux semaines qui ont précédé l'enquête

Thérapeutique de réhydratation orale : une définition qui évolue

La thérapeutique de réhydratation orale (TRO) est la pierre angulaire des programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques. Toutefois, les recommandations qui ont trait à son utilisation ont changé au fil du temps, en raison des progrès de la médecine et des possibilités d'administrer le traitement dans la pratique. Diverses définitions de la TRO ont été adoptées et promues par les pays à différentes époques. Tandis que les recommandations de l'OMS/UNICEF comprennent actuellement une « quantité accrue de liquides et l'alimentation en continu (QAL/AC) », plusieurs pays affichent des taux élevés d'utilisation de la TRO qui s'appuient sur des définitions antérieures, prescrivant notamment l'administration de sels de réhydratation orale (SRO) et de solutions sel/sucre préparées à la maison (SSS). Jusqu'à ce que tous les pays adoptent le traitement de thérapeutique de réhydratation orale actuellement recommandé, il sera difficile de comparer avec précision les taux d'utilisation.