



## Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME)


Plus de 10 millions d'enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de maladies facilement évitables et de troubles pour lesquels il existe des traitements tels que la déshydratation due à la diarrhée, les infections respiratoires aiguës, la rougeole et le paludisme. Dans 50 % des cas, la maladie est aggravée par la malnutrition.

L'initiative Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant a été lancée en 1992 par l'UNICEF et l'OMS afin de prévenir ces maladies infantiles mortelles ou de les détecter et de les traiter le plus vite possible.

La stratégie de Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant part du principe que, dans la plupart des cas, une maladie infantile a plusieurs causes sous-jacentes. Elle est axée sur l'amélioration des traitements administrés à la maison tant au niveau des familles que des communautés et sur la formation du personnel soignant à l'échelle plus vaste du système de santé. Elle préconise de donner aux enfants « une quantité accrue de liquides et une alimentation en continu » dans le cadre de traitements administrés à la maison et utilise ce principe en tant qu'indicateur de l'efficacité du programme.

## ENFANTS TRAITÉS A LA MAISON

Pays dans lesquels 20 % ou plus des enfants de moins de cinq ans malades dans les deux semaines qui ont précédé l'enquête ont reçu une quantité accrue de liquides et une alimentation en continu à la maison.



Source : UNICEF, 2001.

## » Paludisme

### Paludisme


On estime que chaque année, entre 300 et 500 millions de cas de paludisme provoquent un nombre inacceptable de décès, surtout chez les jeunes enfants. La maladie est aussi un facteur d'anémie grave et de grossesse à risque. C'est l'une des principales causes de l'insuffisance pondérale à la naissance et de la mortalité des nourrissons. Malgré l'ampleur de ses conséquences, le paludisme peut être traité efficacement.

Dans le cadre d'une initiative inspirée de la Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant gérée par les familles et les communautés, un plus grand nombre d'enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme pourraient recevoir les soins adéquats dans des établissements de santé. Il faut davantage sensibiliser les familles et les communautés afin que toutes les femmes enceintes et tous les enfants de moins de cinq ans dorment sous des moustiquaires traitées à l'insecticide. En Afrique, par exemple, cette simple mesure pourrait sauver plus de 400 000 enfants par an.



### Données originales sur l'utilisation de moustiquaires\*

Pourcentage d'enfants dormant sous des moustiquaires traitées ou non traitées



\* Données de base obtenues à partir des MICS sur la surveillance du paludisme.  
 \*\* Pas de données disponibles sur l'utilisation de moustiquaires traitées.  
 Source : UNICEF, 2001.