


## Las 4 P:



La campaña mundial tiene por objetivo lograr resultados en favor de la niñez que se puedan cuantificar a partir de objetivos acordados a nivel internacional en cuatro esferas fundamentales:

**Prevenir la transmisión de madre a hijo** : La mayoría del medio millón de niños y niñas menores de 15 años que mueren anualmente por causas relacionadas con el SIDA contraen el VIH a través de la transmisión de madre a hijo. La campaña tiene como objetivo ofrecer para 2010 acceso a servicios destinados a evitar la transmisión de madre a hijo del VIH al 80% de las mujeres que lo necesiten. En la actualidad, menos de un 10% de mujeres tienen acceso a estos servicios.

**Proporcionar tratamiento pediátrico** : Menos de un 5% de todos los niños y niñas seropositivos de corta edad que necesitan tratamiento pediátrico contra el SIDA lo están recibiendo, y solamente un 1% de los niños y niñas nacidos de madres seropositivas tienen acceso al cotrimoxazol, un antibiótico de bajo costo que combate las infecciones mortales y por ello puede reducir casi a la mitad las muertes debidas al SIDA. La campaña tiene por objetivo proporcionar acceso al tratamiento antirretroviral y/o cotrimoxazol a un 80% de los niños y niñas que lo necesiten.

**Prevenir la infección** : Los adolescentes y los jóvenes de 15 a 24 años representan aproximadamente la mitad de las nuevas infecciones por VIH, pero la gran mayoría de los jóvenes carecen de acceso a la información, aptitudes y servicios necesarios para protegerse del VIH. La campaña tiene como objetivo reducir en un 25% para 2010 el porcentaje mundial de jóvenes que viven con VIH, de conformidad con los objetivos adoptados internacionalmente.

**Proteger y apoyar a los niños y niñas afectados por el SIDA** : Se calcula que para 2010 habrá 18 millones de niños y niñas que hayan perdido a por lo menos uno de sus progenitores debido al SIDA, solamente en África subsahariana. Mucho antes de que muera el padre o la madre, los niños, y especialmente las niñas, tienen que asumir tareas propias de los adultos como cuidar de los enfermos, ocuparse de los hermanos y hermanas más jóvenes, generar ingresos para pagar los costos de la salud, o producir alimentos. Con frecuencia tienen que abandonar la escuela. La campaña tiene como objetivo llegar para 2010 al 80% de los niños y niñas más necesitados de apoyo y servicios.

### **"Las 4 P" incluyen:**

- **Prevención primaria: Reducir el número, por lo menos a la mitad, de nuevas personas jóvenes infectadas por VIH para 2010.**

La única manera segura de reducir la pandemia de SIDA es a través de la prevención primaria. El camino más rápido y efectivo es la promoción de las relaciones sexuales sin riesgo. En la actualidad, solo un 30% de los jóvenes tienen acceso a información, conocimientos y habilidades o servicios esenciales para la prevención del VIH/SIDA. La campaña intenta ampliar esta cobertura a por lo menos un 80% de los jóvenes para 2010.

- **Prevención de transmisión vertical (madre a hijo): Incrementar la cobertura de la proporción de mujeres embarazadas que viven con VIH y que tienen acceso a servicios para la prevención de la transmisión vertical, del 3% al 80% para 2010.**

La gran mayoría del medio millón de niños y niñas menores de 15 años que mueren por causas relacionadas al VIH/SIDA son víctimas de

transmisión vertical. Sin embargo, a la gran mayoría de las mujeres que viven con VIH no se les ofrece tratamiento para prevenir la infección de sus hijos e hijas durante el embarazo, nacimiento o amamantamiento. La campaña busca incrementar la cobertura de mujeres que tienen acceso a servicios de prevención del 3% al 80% para 2010.

- **Provisión de tratamiento pediátrico : Proporcionar antibióticos, como cotrimoxazol y terapia antirretroviral, a niños y niñas.**

Los niños y niñas que viven con VIH están propensos a morir por infecciones oportunistas o infecciones comunes de la infancia, si no reciben tratamiento para prevenir estas infecciones o terapia antirretroviral. Antibióticos como el cotrimoxazol protegen a los niños contra infecciones oportunistas, incluyendo el paludismo (o malaria) y la neumonía; estos tratamientos han demostrado que se puede reducir la mortalidad de los niños y niñas que viven con VIH en un 43%. Por solo tres centavos de dólar de EEUU al día, cotrimoxazol es una opción de bajo costo que puede resultar de importancia vital para los niños y niñas expuestos al VIH. **Sin embargo, solo 1%** de los niños y niñas que nacen de mujeres que viven con el VIH tiene acceso al tratamiento.

Los niños y niñas responden bien a los tratamientos antirretrovirales. Pero a pesar de los enormes progresos alcanzados en el acceso de los adultos al tratamiento, en la actualidad **menos del 2% de los niños y niñas** que necesitan terapia antirretroviral la están recibiendo. **“Únete por la niñez. Únete con la juventud. Únete para vencer al SIDA”** busca promover un mejor seguimiento, identificación, cuidado y apoyo a niños y niñas que necesitan cotrimoxazol y tratamiento antirretroviral. La campaña aspira a proporcionar acceso a tratamiento médico para un 80% de los niños que viven con VIH para 2010.

- **Protección, cuidado y apoyo a los niños y niñas afectados por el VIH/SIDA: Alcanzar al 80% de los niños y niñas en necesidad de protección, servicios esenciales y apoyo para 2010.**

A pesar de mostrar extraordinaria disposición para asumir el cuidado de los huérfanos u otros niños y niñas afectados por el VIH/SIDA, las familias extendidas ya están sobrecargadas de obligaciones. Entre las metas que se propone la campaña está ofrecer apoyo a los programas

dedicados a fortalecer a las familias; movilizar las respuestas de las comunidades; asegurar que los huérfanos y los niños mas vulnerables tengan acceso a servicios esenciales, incluyendo educación y servicios de salud; asegurar que los gobiernos ofrezcan protección a los niños vulnerables a través de políticas publicas y marcos legales; y aumentar la toma de conciencia en todos los ámbitos para crea ambientes favorables y de apoyo para los niños, niñas y las familias afectadas por el VIH/SIDA.