

**TABLA 1: Prevalencia de la DESNUTRICION CRONICA (retraso del crecimiento) en 22 países de ALC –  
PROMEDIOS NACIONALES**

(niños y niñas menores de cinco años; talla por edad, <-2 SD, %)

<b>Argentina</b>	12,9	<b>Guyana</b>	10,8
<b>Bolivia</b>	25,6	<b>Haití</b>	22,7
<b>Brasil</b>	10,5	<b>Honduras</b>	36,2
<b>Chile</b>	1,6	<b>Jamaica</b>	5,9
<b>Colombia</b>	14,0	<b>México</b>	17,8
<b>Costa Rica</b>	6,1	<b>Nicaragua</b>	20,0
<b>Cuba</b>	5,0	<b>Panamá</b>	14,4
<b>Rep. Dominicana</b>	8,9	<b>Paraguay</b>	13,7
<b>Ecuador</b>	26,0	<b>Perú</b>	25,2
<b>El Salvador</b>	23,3	<b>Uruguay</b>	12,7
<b>Guatemala</b>	48,7	<b>Venezuela</b>	12,7

**TABLA 2: RAZON entre las AREAS DE PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA (RETRASO DEL CRECIMIENTO) MAS ALTA Y MAS BAJA en 13 países de ALC<sup>1</sup>**  
- Niños y niñas menores de cinco años -  
(medidas de talla frente a peso)


	Area de mayor prevalencia (%)		Area de menor prevalencia (%)		RAZON entre mayor y menor
<b>Brasil</b>	17,9	Región nororiental	2,9	Región sur	<b>6,2</b>
<b>Nicaragua</b>	36,7	Jinotega	8,2	Managua	<b>4,5</b>
<b>Argentina</b>	21,9	Chaco	5,4	Buenos Aires	<b>4,1</b>
<b>México</b>	29,2	Región sur	7,1	Región norte	<b>4,1</b>
<b>Paraguay</b>	22,2	Canindeyú	6,4	Asunción	<b>3,5</b>
<b>Colombia</b>	24,5	Cauca/Nariño	7,3	Atlántico/norte de Bolívar o Cali	<b>3,4</b>
<b>Venezuela</b>	24,1	Delta Amacuro	8,7	Distrito Federal	<b>2,8</b>
<b>Bolivia</b>	49,2	Potosí	17,5	Santa Cruz	<b>2,8</b>
<b>Honduras</b>	62,6	Intibuca	23,3	Isla de la Bahía	<b>2,7</b>
<b>Cuba</b>	6,5	Región occidental	2,5	Región central	<b>2,6</b>
<b>Haití</b>	33,0	Región central	16,3	Area metropolitana	<b>2,0</b>
<b>Guatemala</b>	67,2	Región noroccidental	35,7	Area metropolitana	<b>1,9</b>
<b>Ecuador</b>	35,5	Bolívar	21,9	Guayas	<b>1,6</b>

<sup>1</sup> Solamente los países con datos discriminados geográficamente pudieron ser analizados de esta manera. Los datos proceden de diversas fuentes, y corresponden a un período que va de 1996 a 2002.


**TABLA 3: RANGO DE DISPARIDAD ENTRE LAS AREAS DE MAYOR Y MENOR PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA (RETRASO DEL CRECIMIENTO) en 13 países de ALC**  
- Niños y niñas menores de cinco años -  
(medidas de talla frente a edad, <-2SD)

	<b>RANGO de disparidad entre áreas de mayor y menor prevalencia</b>	<b>Promedios nacionales: desnutrición crónica (%)</b>
<b>Brasil</b>	1,4	10,5
<b>Nicaragua</b>	1,4	20,0
<b>Argentina</b>	1,3	12,9
<b>Venezuela</b>	1,2	12,7
<b>Paraguay</b>	1,2	13,7
<b>Colombia</b>	1,2	14,0
<b>México</b>	1,2	17,8
<b>Bolivia</b>	1,2	25,6
<b>Honduras</b>	1,1	36,2
<b>Cuba</b>	0,8	5,0
<b>Haití</b>	0,7	22,7
<b>Guatemala</b>	0,6	48,7
<b>Ecuador</b>	0,5	26,0

**MAYOR DISPARIDAD**




GRAFICA 2



Fuente: Información obtenida de las Oficinas de País y Regional de UNICEF en ALC a marzo de 2003.

**GRAFICA 3** RANGO DE DISPARIDAD ENTRE LOS PROMEDIOS NACIONALES Y EL AREA DE MAYOR PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA




Fuente: Información obtenida de las Oficinas de País y Regional de UNICEF en ALC a marzo de 2003.

## GRAFICA 5: DISPARIDADES URBANO-RURALES: DESNUTRICION CRONICA\*

UNICEF-TACRO

en comparación con los promedios nacionales

(niños y niñas moderada y severamente desnutridos menores de cinco años)



Fuente: Información obtenida de las Oficinas de País y Regional de UNICEF en ALC, a febrero de 2003.

No se dispone de datos urbano-rurales para los países que no se muestran.

\*Medida por talle según edad, <-2SD.