

TABLA 4: RAZON entre las AREAS DE PREVALENCIA DE BAJO PESO MAS ALTA Y MAS BAJA en 12 países de ALC

(Niños y niñas menores de cinco años, medidas de peso frente a edad)

	Area de mayor prevalencia (%)		Area de menor prevalencia (%)		RAZON entre mayor y menor
Paraguay	11,1	Itapúa	0,5	Ñeembucú	22,2
Guatemala	29,5	Región noroccidental	14,8	Area metropolitana	14,8
Venezuela	16,8	Delta Amacuro	2,4	Distrito Federal	7,0
Argentina	19,8	Santiago del Estero	3,0	Rosario/Buenos Aires	6,6
Brasil	17,9	Región nororiental	2,9	Región sur	6,2
Nicaragua	36,7	Jinotega	8,2	Managua	4,5
México	12,0	Región sur	3,3	Región norte	3,6
Bolivia	16,2	Potosí	4,7	Tarija	3,4
Colombia	11,9	Bolívar/Sucre/Córdoba	4,1	Cali	2,9
Cuba	6,7	Región occidental	3,6	La Habana	1,5
Haití	18,2	Cayes	12,4	Puerto Príncipe	1,5
Ecuador	13,0	Sierra	10,0	Costa	1,3

TABLA 5: RANGO DE DISPARIDAD ENTRE LAS AREAS DE PREVALENCIA DE BAJO PESO MAS ALTA Y MAS BAJA en 12 países en ALC

(Niños y niñas menores de cinco años, medidas de peso frente a edad <-2SD)

	RANGO de disparidad	Promedios nacionales: bajo peso (%)
Venezuela	3,2	4,5
Argentina	3,1	5,4
Paraguay	2,3	4,6
Nicaragua	1,5	9,6
Bolivia	1,2	9,5
Brasil	1,1	5,7
Colombia	1,1	7,0
México	1,1	7,6
Cuba	0,8	4,0
Guatemala	0,7	21,9
Ecuador	0,3	12,0
Haití	0,3	17,3


MAYOR DISPARIDAD





UNICEF-TACRO

GRAFICA 4 RANGO DE DISPARIDAD de las áreas de prevalencia de BAJO PESO más alta y más baja dentro de los países en comparación con los promedios nacionales (niños y niñas moderada y severamente desnutridos menores de cinco años)



Fuente: Información obtenida de las Oficinas de País y Regional de UNICEF en ALC, a marzo de 2003.

