

VIH/SIDA & Niñez **Datos a nivel global**

XVII Conferencia Internacional de SIDA, 3-8 de agosto de 2008
Ciudad de México, México

Situación¹

- En todo el mundo, 2 millones² de los 33 millones³ de personas que se calcula que vivían con VIH en 2007 eran niños menores de 15 años.
- En 2007, alrededor del 45% de las nuevas infecciones por VIH entre personas de más de 15 años de edad correspondían a jóvenes de 15 a 24 años. En 2007, se calcula que alrededor de 5,5 millones de jóvenes de 15 a 24 años vivían con VIH.
- En 2007, alrededor de 370.000⁴ contrajeron la infección por VIH, y 270.000⁵ murieron de SIDA. En África subsahariana vive alrededor del 90% de todos los niños menores de 14 años que viven con VIH.
- La mayoría de los niños con VIH contraen el virus durante el embarazo de sus madres, durante el parto o en el periodo de lactancia materna. Alrededor del 50% de todos los niños con VIH mueren antes de cumplir 2 años.
- En África subsahariana, el número estimado de niños menores de 18 años huérfanos a causa del SIDA casi se duplicó entre 2001 y 2007, y alcanzó la cifra de cerca de 12 millones⁶.
- En 2007, solamente el 12% de las mujeres a quienes se detectó el VIH durante una visita prenatal fueron examinadas con el fin de establecer si cumplían los requisitos para recibir la terapia antirretroviral en beneficio de ellas mismas. Entre los países que ofrecen datos desagregados sobre los regímenes antirretrovirales utilizados para evitar la transmisión de madre a hijo, solamente un 9% recibieron terapia antirretroviral en beneficio de ellas mismas⁷.

Progresos y desafíos

- Alrededor de un 18% de las mujeres embarazadas de los países de bajos y medianos ingresos fueron sometidas a una prueba del VIH en 2007, en comparación con un 10% en 2004⁸.
- De los 115 millones de mujeres que dan a luz todos los años en los países de bajos y medianos ingresos, alrededor de 1,5 millones tienen VIH⁹.
- En 2007, un 33% de los 1,5 millones de mujeres con VIH embarazadas recibieron antirretrovirales para evitar la transmisión por VIH, en comparación con un 10% en 2004¹⁰.

¹ La infancia y el SIDA: Segundo balance de la situación 2008.

² La escala es de 1,9-2,3 millones

³ La escala es de 30,3-36,1 millones

⁴ La escala es de 330.000-410.000

⁵ La escala es de 250.000-290.000

⁶ La escala es de 250.000-290.000

⁷ Universal Access Report 2008 – pág. 7 –

⁸ UAR – pág. 79

⁹ UAR – pág. 80

¹⁰ UAR – pág. 70

- Las últimas pruebas sugieren que la prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas de 15 a 24 años que asisten a las clínicas prenatales se ha reducido desde 2000-2001 en 14 de los 17 países con datos suficientes¹¹. Esta cifra incluye nueve países de África oriental y meridional¹².
- En la actualidad, más de 70 países en desarrollo incluyen enseñanzas basadas en las aptitudes para la vida práctica con un enfoque dirigido al VIH en sus planes nacionales de estudios¹³.
- Los jóvenes de ambos sexos con edades de 15 a 24 años tienen una comprensión más amplia del VIH y de su prevención. Pero el aumento de las tasas de conocimiento no es lo suficientemente rápido como para alcanzar la meta del 95% para 2010.
- En muchos países se llevan a cabo amplios esfuerzos encaminados a ampliar la protección, la atención y el apoyo a los niños afectados por el SIDA. La diferencia en las tasas de matriculación escolar entre los niños que han perdido a ambos progenitores debido SIDA y otros niños se está reduciendo, y un número cada vez mayor de niños y niñas vulnerables tienen acceso a la educación y a la protección social¹⁴.
- En 2007 había 197.600 niños que recibían terapia antirretroviral, un aumento de los 127.300 de 2006 y los 75.000 de 2005. Esto representa un aumento de un 55% desde 2006 hasta 2007, y de un 78% desde 2005 hasta 2006¹⁵.
- Un diagnóstico temprano del lactante es una intervención fundamental para los recién nacidos expuestos al VIH. Los lactantes con un diagnóstico positivo pueden comenzar a recibir inmediatamente tratamiento antirretroviral. Se ha demostrado que esto se relaciona con una reducción del 76% en la mortalidad cuando se compara con la iniciación del tratamiento solamente después de que comienzan a surgir los signos y síntomas relacionados con el VIH. En los países con datos disponibles había alrededor de 54.900 lactantes que fueron sometidos a una prueba virológica del VIH durante sus 2 primeros meses de vida. Esta cifra representa solamente un 4% de los 1,5 millones de lactantes que se calcula que nacen de madres con VIH embarazadas todos los años¹⁶.
- La capacidad y el apoyo a las políticas en favor del diagnóstico temprano del lactante se han intensificado durante los dos últimos años. El número de países que utilizan la prueba con muestras de sangre seca, un importante mecanismo para ampliar el acceso a las pruebas virológicas, aumentó de 17 en 2005 a 30 en 2007¹⁷.

¹¹ Catorce de 17 países que disponen de datos suficientes para analizar tendencias recientes en los países más afectados (suficientes datos sobre la prevalencia procedentes de tres años diferentes). Estos países incluyen las Bahamas, Benin, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibia, la República Unida de Tanzania, Rwanda, Swazilandia, y Zimbabwe.

¹² Informe Mundial sobre el SIDA 2008

¹³ Informe sobre el balance de la situación, 2008, pág. 19

¹⁴ Informe sobre el balance de la situación 2008 – pág. 3

¹⁵ UAR – pág. 7

¹⁶ UAR – pág. 96

¹⁷ UAR – pág. 95