


## Meta

Reducción de la tercera parte de las muertes a raíz de infecciones agudas de las vías respiratorias en los niños menores de cinco años


## Los niños de las zonas rurales reciben menos atención (ERA)

Porcentaje de niños con infecciones agudas de las vías respiratorias que acudieron a un servicio de salud\*, por lugar de residencia



Fuentes de los gráficos y los mapas: UNICEF, 2001.


# » Infecciones agudas de las vías respiratorias



## Pocos niños reciben tratamiento para las ERA

Porcentaje de niños con ERA que acudieron a un servicio de salud, 1990-2000

60%+ 40-59% 20-39% 0-19% Sin datos



## Resultados

En 1992 se concibió la Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI). La iniciativa tiene por fin, al igual que los programas comunitarios de atención de la salud, impartir cursos a quienes cuidan a los niños para que estén en condiciones de reconocer los signos de las infecciones agudas de las vías respiratorias y procuren que el paciente reciba tratamiento a tiempo fuera del hogar.

### ... pero


En más de 40 países de los 82 países con datos disponibles, menos del 50% de los niños que padecían infecciones agudas de las vías respiratorias acudieron a un servicio de salud. En muchos países es necesario además contar con servicios de salud idóneos y disponer de antibióticos en mayor medida.

## Problema

En los países en desarrollo, las infecciones agudas de las vías respiratorias son la causa principal de mortalidad de niños menores de cinco años. La infección más grave es la neumonía, que suele tratarse recurriendo a antibióticos económicos. En cuanto los niños presentan signos de infecciones agudas de las vías respiratorias –a saber, tos y respiración rápida y entrecortada– se debería procurar que el niño reciba atención sanitaria idónea.

## Diferencias regionales en la atención que se presta a los menores

Amplias diferencias entre países y regiones en la promoción de una conducta que promueva la búsqueda de atención en los casos de ERA



Los dos puntos en los datos de cada región muestran las tasas superiores e inferiores de los países cuando se trata de llevar a los niños con ERA a un proveedor de la salud.

\*Los proveedores de la salud incluyen hospitales, centros de salud, dispensarios, trabajadores sanitarios de poblados, clínicas infantiles y de maternidad, clínicas móviles y ambulantes y médicos privados. En 15 países (sobre todo en América Latina y Oriente Medio) se incluyeron las farmacias.