

Meta

Reducir en un 50% la tasa de mortalidad materna (TMM) entre 1990 y el año 2000

» Mortalidad derivada de la maternidad



RIESGO DE MUERTE: 1 EN 13

En Africa subsahariana una mujer tiene 1 de cada 13 posibilidades de morir durante el parto, en comparación con la tasa de 1 de cada 4.100 en los países industrializados.

Región	Riesgo de morir durante el embarazo o el parto*
Africa subsahariana	1 en 13
Asia meridional	1 en 55
Oriente Medio/Africa septen.	1 en 55
América Latina/Caribe	1 en 160
Asia oriental/Pacífico	1 en 280
ECO/CEI	1 en 800
Países menos adelantados	1 en 16
Países en desarrollo	1 en 60
Países industrializados	1 en 4,100
Mundo	1 en 75

* No sólo por las tasas de mortalidad derivada de la maternidad sino también por el número de nacimientos por mujer.

Fuente: OMS, UNICEF y FNUAP, *Maternal Mortality in 1995: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, 2001.*

Resultados

La atención obstétrica durante el alumbramiento ha aumentado en todas las regiones en desarrollo. Sin embargo, en algunos países, y en Africa subsahariana en su conjunto, donde la mortalidad derivada de la maternidad es más elevada, la atención obstétrica no ha mejorado notablemente.

... pero

Es preciso que todas las mujeres reciban acceso a la atención prenatal y una atención obstétrica de calidad.

Problema

Las complicaciones surgidas durante el embarazo y el parto son la causa principal de muerte y discapacidad entre mujeres de edad fecunda en los países en desarrollo. Cada año mueren por tal causa unas 515.000 mujeres.

Por cada mujer que fallece, casi 30 sufren lesiones, infección y distintas formas de discapacidad a raíz del embarazo o el alumbramiento. En consecuencia, por lo menos 15 millones de mujeres son cada año víctimas de discapacidades de esta índole.


La dificultad de supervisar los progresos

Es difícil medir las tendencias de la mortalidad materna. Tan sólo unos cuantos países disponen de los sistemas de registro civil indispensables para observar tales tendencias. En los países que poseen tales medios se registra sólo cerca de la cuarta parte de los nacidos vivos y relativamente pocas muertes de madres.

Se ha recomendado considerar la proporción de partos asistidos por personal sanitario capacitado como medida fiable de los progresos alcanzados en la esfera de la mortalidad materna. Tal como se indica en el gráfico (abajo), en Africa subsahariana, donde la mortalidad materna alcanza la cifra más elevada, no se ha incrementado la atención especializada en el alumbramiento.

Tendencias en la presencia de atención obstétrica en el parto (1990-2000)


En Africa subsahariana, donde la mortalidad derivada de la maternidad es mayor, la atención obstétrica no ha mejorado



Fuente: UNICEF, 2001.

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad*, por región

Los niveles más elevados en África subsahariana




*Tasa de mortalidad derivada de la maternidad por cada 100.000 nacidos vivos, 1995.

Fuente: OMS, UNICEF y FNUAP, *Maternal Mortality in 1995: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, 2001.*

Riesgo de morir al dar la vida

Tasa de mortalidad derivada de la maternidad por cada 100.000 nacidos vivos



Fuente: OMS, UNICEF y FNUAP, *Maternal Mortality in 1995: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, 2001.*

Atención obstétrica esencial

La atención obstétrica básica es de importancia decisiva para la reducción de la mortalidad materna. Es de lamentar que, en el caso de numerosos países, aún no se disponga de información de nivel nacional a propósito de la existencia y la utilización de establecimientos de atención obstétrica básica.


La tasa de partos con cesárea sirve como indicador de que los establecimientos de atención obstétrica básica brindan servicios obstétricos gracias a los cuales se salvan vidas. La cesárea es uno de los procedimientos a los que se recurre cuando se presentan complicaciones obstétricas graves. El UNICEF, la OMS y el FNUAP calculan que en por lo menos 5% de los alumbramientos resulta necesario practicar una cesárea a fin de salvar la vida o conservar la salud de la madre o el niño. Que la información revele que se recurre a la cesárea en menos de 5% de los alumbramientos significa que no se está dando la atención necesaria a algunas complicaciones que entrañan peligro de muerte. Que las tasas superen el 15% es índice de que el procedimiento se emplea en forma inapropiada.

Falta de servicios: dónde las tasas de partos con cesárea son menos de 5%

Chad	0.5	Togo	2.0
Madagascar	0.6	Benin	2.2
Níger	0.6	Senegal	2.2
Etiopía	0.7	Uganda	2.6
Malí	0.8	Mozambique	2.7
Nepal	1.0	Tanzanía	2.9
Burkina Faso	1.1	Uzbekistán	3.0
Yemen	1.4	Viet Nam	3.4
Eritrea	1.6	Nigeria	3.7
Rep. Centroafricana	1.9	Camerún	4.2
Zambia	1.9	Indonesia	4.3
Guinea	2.0		

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud, 1993-2000.

Muertes derivadas de la maternidad: 515.000 (aprox.)



Fuente: OMS, UNICEF y FNUAP, *Maternal Mortality in 1995: Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA, 2001.*