



Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI)


Más de 10 millones de niños menores de 5 años mueren cada año a causa de enfermedades que es sencillo prevenir y enfermedades que se pueden tratar como la deshidratación provocada por la diarrea, las infecciones agudas de las vías respiratorias, el sarampión y el paludismo. En la mitad de los casos, la enfermedad se ve complicada por un cuadro de malnutrición.

En 1992, el UNICEF y la OMS propusieron la iniciativa de la Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) con miras a evitar las principales enfermedades que provocan la muerte de los niños o a fin de detectarlas y tratarlas lo antes posible.

Los responsables de la iniciativa, conscientes de que, en la mayoría de los casos, la enfermedad del niño no se debe a una causa única, adoptaron un enfoque amplio e intersectorial. La AIEPI concede especial importancia a dar medios a la familia y a la comunidad para mejorar las prácticas al uso en el tratamiento de la enfermedad en el hogar así como a mejorar la capacidad de atención de los casos de trabajadores sanitarios que prestan servicios en el sistema de salud más amplio. La AIEPI recomienda igualmente “la ingestión de mayor cantidad de líquidos y el mantenimiento de la alimentación sólida” para el tratamiento en el hogar de las enfermedades prevalentes de la infancia y utiliza este principio como un indicador aproximado de la eficacia de los programas.

NIÑOS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN CASA

Países en los que un 20% o más de menores de 5 años con alguna enfermedad en las dos semanas anteriores a la encuesta recibieron un aumento en los fluidos y alimentación continuada en el hogar



Fuente: UNICEF, 2001.

» Paludismo




El paludismo

Se calcula que cada año entre 300 y 500 millones de casos de paludismo provocan un número elevado e inaceptable de muertes, especialmente de niños. El paludismo provoca también anemia aguda y morbilidad materna y contribuye al bajo peso al nacer, uno de los principales factores de riesgo en la mortalidad infantil. Pese al número de víctimas del paludismo, es posible hacer frente a esta enfermedad.

En el marco de una iniciativa de salud integrada de cuya gestión se encargan las familias y las comunidades y cuyas raíces se remontan a la AIEPI, más niños menores de cinco años enfermos de paludismo podrían recibir tratamiento idóneo en establecimientos de salud. Es menester que las familias y las comunidades cobren cada vez mayor conciencia de la importancia de que las mujeres embarazadas y todos los niños menores de cinco años duerman bajo mosquiteros impregnados con insecticida. Tal medida podría salvar cada año, en África, por ejemplo, las vidas de más de 400.000 niños.

Datos sin precedentes en el uso de mosquiteros*

Porcentaje de niños que durmieron bajo mosquiteros **impregnados** o **no**



* Para la vigilancia del paludismo, datos de MICS.
** Sin datos sobre el uso de mosquiteros impregnados.
Fuente: UNICEF, 2001.