

Figure 1.2

## Progress par région en matière de réduction de la mortalité infantile

Taux annuel moyen de régression (TAMR) du taux de mortalité des moins de 5 ans (TMM5) observé pendant la période 1990–2006 et requis pendant la période 2007–2015 pour atteindre l'OMD 4.

	TMM5		TAMR (%)*		Progress vers la réalisation de la cible de l'OMD
	1990	2006	Observé 1990–2006	Requis 2007–2015	
Afrique subsaharienne	187	160	1,0	10,5	progress insuffisants
Afrique de l'Est et australe	165	131	1,4	9,6	progress insuffisants
Afrique de l'Est†	171	123	2,1	8,5	progress insuffisants
Afrique australe	125	146	-1,0	13,9	aucun progress
Afrique de l'Ouest et centrale	208	186	0,7	11,0	aucun progress
Afrique centrale	187	193	-0,2	12,6	aucun progress
Afrique de l'Ouest	215	183	1,0	10,4	progress insuffisants
Afrique du Nord	82	35	5,3	2,8	sur la bonne voie
Asie du Sud	123	83	2,5	7,8	progress insuffisants
Asie de l'Est/Pacifique	55	29	4,0	5,1	sur la bonne voie
Amérique latine/Caraiibes	55	27	4,4	4,3	sur la bonne voie
ECO/CEI**	53	27	4,2	4,7	sur la bonne voie
Pays industrialisés	10	6	3,2	6,6	sur la bonne voie
Pays en développement	103	79	1,7	9,3	progress insuffisants
Monde	93	72	1,6	9,4	progress insuffisants

\* Un TAMR négatif indique un accroissement du taux de mortalité des moins de 5 ans depuis 1990.

† Y compris Djibouti et le Soudan.

\*\* Europe centrale et orientale/Communauté d'États indépendants.

**Sur la bonne voie** : le TMM5 est inférieur à 40, ou le TMM5 est égal ou supérieur à 40 et le TAMR du taux de mortalité des moins de 5 ans observé pendant la période 1990–2006 est égal ou supérieur à 4,0 %.

**Progress insuffisants** : le TMM5 est égal ou supérieur à 40, et le TAMR est compris entre 1,0 % et 3,9 %.

**Aucun progress** : le TMM5 est égal ou supérieur à 40, et le TAMR est inférieur à 1,0 %.

**Source** : estimations de l'UNICEF fondées sur les travaux du Groupe interinstitutions pour les estimations en matière de mortalité infantile.