

Figure 1.7

L'Afrique subsaharienne ne progresse pas assez, ou pas du tout, vers l'ensemble des OMD liés à la santé

INDICATEURS DE PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT	ESTIMATIONS FERMES LES PLUS RÉCENTES	TAUX ANNUEL MOYEN DE RÉGRESSION (1990-2006)	PROGRÈS VERS LA CIBLE DE L'OMD
OMD 1			
Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans	28 % (2000–2006)	1,1	Progrès insuffisants
OMD 4			
Taux de mortalité des moins de 5 ans	187 pour 1 000 naissances vivantes (1990); 160 pour 1 000 naissances vivantes (2006)	1,0	Progrès insuffisants
OMD 5			
Taux de mortalité maternelle, ajusté	920 pour 100 000 naissances vivantes (2005)	s/o	'Très élevé''*
OMD 6			
Paludisme, enfants de moins de 5 ans dormant sous une moustiquaire traitée à l'insecticide	8 % (2003–2006)	s/o	Doit encore maîtriser la propagation du paludisme et inverser la tendance
Infections pédiatriques par le VIH (enfants âgés de 1 à 14 ans)	2,0 millions (2005)	s/o	Doit encore maîtriser la propagation du VIH et inverser la tendance
Prévalence du VIH chez les jeunes femmes enceintes (âgées de 15 à 24 ans) dans la capitale	9,7 % (2005)	s/o	Doit encore maîtriser la propagation du VIH et inverser la tendance
OMD 7			
Utilisation de sources améliorées d'eau potable	48 % (1990); 55 % (2004)	s/o	Aucun progrès
Utilisation d'installations sanitaires améliorées	32 % (1990); 37 % (2004)	s/o	Aucun progrès

* 'Très élevé' indique un taux de mortalité maternelle d'au moins 550 décès de femmes succombant à des causes liées à la grossesse pour 100 000 naissances vivantes.

Source : UNICEF, *Progrès pour les enfants : Un monde digne des enfants, bilan statistique*, Numéro 6, décembre 2007; et *La Situation des enfants dans le monde 2008*; Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA, *Rapport 2006 sur l'épidémie mondiale de SIDA*, ONUSIDA, Genève, 2006.