

Figure 1.9

## Nutrition infantile dans les sous-régions d'Afrique

	% de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance 1999–2006*	% d'enfants nourris au sein (2000-2006*) :			% d'enfants de moins de 5 ans (2000-2006)* souffrant :				Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A (6-59 mois) 2005		% de ménages consommant du sel iodé
		exclusivement (<6 mois)	plus aliments de sevrage (6–9 mois)	encore allaités (20–23 mois)	d'insuffisance pondérale		d'émaciation	de retard de croissance	au moins une dose (%)	couverture totale** (%)	2000–2006*
					modérée et grave	grave	modérée et grave	modéré et grave			
Afrique centrale	13	21	75	47	29	9	12	37	93	86	65
Afrique de l'Est	16	42	69	56	30	8	8	41	79	71	47
Afrique du Nord	12	31	61	29	6	1	5	16	-	-	71
Afrique australe	12	17	66	41	23	-	6	41	56	50	-
Afrique de l'Ouest	15	21	58	46	28	8	10	36	82	80	74
Sahel	18	16	55	66	34	11	13	37	89	85	45
Corne de l'Afrique	19	45	50	-	38	11	11	45	59	58	20

\* Les données portent sur l'année disponible la plus récente pendant la période spécifiée.

\*\* Pourcentage d'enfants à qui l'on a administré deux doses.

**Source :** Estimations de l'UNICEF fondées sur des données extraites de : Enquêtes démographiques et sanitaires, Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, Organisation mondiale de la Santé, UNICEF, autres enquêtes nationales sur les ménages et données figurant dans des systèmes d'établissement de rapports de routine.