



PERFIL DA CRIANÇA EM ANGOLA

IIMS 2023-2024



PERFIL DA CRIANÇA EM ANGOLA

INQUÉRITO DE INDICADORES MÚLTIPLOS E DE SAÚDE-IIMS 2023-2024

Junho 2026

FICHA TÉCNICA

Supervisão

Joel Futi

Presidente do Conselho de Administração

Coordenação

Teresa Spínola

Administradora

Equipa Técnica

Eliana Quintas

Eugenia Ulo

Patrick Pedro

Teresa Gonçalves

Orlanda Costa

Alcides Cambundo

Rosa Samba

Chissola Carvalho

Edição, Composição, Impressão e Difusão

Instituto Nacional de Estatística

Gabinete de Comunicação Institucional e Difusão

Avenida: Ho-Chi-Minh; Caixa Postal n.º 1215

Tel.: (+244) 924 354 015

Luanda – Angola

<https://www.ine.gov.ao>;

geral@ine.gov.ao

Tiragem

Formato digital

Reprodução autorizada, excepto para fins comerciais, com indicação da fonte bibliográfica
©INE. Luanda, Angola - 2026.

Para esclarecimento e informação adicional sobre o conteúdo desta publicação, por favor
contactar: Gabinete de Comunicação Institucional e Difusão - Tel.: (+244) 924 354 015
E-mail: geral@ine.gov.ao/ geraline9@gmail.com

ÍNDICE

PREFÁCIO	17
1. NOTA INTRODUTÓRIA	7
2. SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS	8
2.1. <i>Estrutura da População Infantil</i>	8
2.2. <i>Registo de Nascimento nas Crianças Menores de 5 Anos</i>	8
2.3. <i>Frequência Escolar</i>	8
2.4. <i>Prevenção Contra Malária</i>	8
2.5. <i>Mortalidade Infantil</i>	8
2.6. <i>Estado Nutricional das Crianças</i>	9
2.7. <i>Acesso à Água e Saneamento</i>	9
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS	10
4. INDICADORES DOS OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	11
QUADROS DE RESULTADOS	14
INDICADORES ANGOLA	16
INDICADORES CABINDA	20
INDICADORES ZAIRE	24
INDICADORES UÍGE	28
INDICADORES LUANDA	32
INDICADORES CUANZA NORTE	36
INDICADORES CUANZA SUL	40
INDICADORES MALANJE	44
INDICADORES LUNDA NORTE	48
INDICADORES BENGUELA	52
INDICADORES HUAMBO	56
INDICADORES BIÉ	60
INDICADORES MOXICO	64
INDICADORES CUANDO CUBANGO	68
INDICADORES NAMIBE	72
INDICADORES HUÍLA	76
INDICADORES CUNENE	80
INDICADORES LUNDA SUL	84
INDICADORES BENGUELA	88

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1 - Indicadores dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável	11
Quadro 2 - Indicadores-Chave Angola	16
Quadro 3 - Indicadores-Chave Província de Cabinda	20
Quadro 4 – Indicadores-Chave Província do Zaire	24
Quadro 5 – Indicadores-Chave Província do Uíge	28
Quadro 6 – Indicadores-Chave Província de Luanda	32
Quadro 7 – Indicadores-Chave Província do Cuanza Norte.....	36
Quadro 8 – Indicadores-Chave Província do Cuanza Sul	40
Quadro 9 – Indicadores-Chave Província de Malanje	44
Quadro 10 – Indicadores-Chave Província da Lunda Norte.....	48
Quadro 11 – Indicadores-Chave Província de Benguela.....	52
Quadro 12 – Indicadores-Chave Província do Huambo.....	56
Quadro 13 – Indicadores-Chave Província do Bié	60
Quadro 14 – Indicadores-Chave Província do Moxico.....	64
Quadro 15 – Indicadores-Chave Província do Cuando Cubango	68
Quadro 16 – Indicadores-Chave Província do Namibe.....	72
Quadro 17 – Indicadores-Chave Província da Huíla	76
Quadro 18 – Indicadores-Chave Província do Cunene	80
Quadro 19 – Indicadores-Chave Província da Lunda Sul	84
Quadro 20 – Indicadores-Chave Província do Bengo	88

PREFÁCIO

As crianças representam mais de metade da população angolana e constituem o recurso mais valioso do país para a construção de um futuro mais próspero, inclusivo e sustentável. Garantir que cada criança sobreviva, aprenda, esteja protegida e desenvolva plenamente o seu potencial não é apenas um compromisso assumido por Angola, através da Convenção sobre os Direitos da Criança, mas também uma condição essencial para o desenvolvimento nacional.

É neste contexto que apresentamos o *Perfil da Criança em Angola 2026*, uma publicação elaborada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), com o apoio do Fundo da Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que reúne os principais indicadores sobre a situação das crianças no país, com base nos dados do Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS 2023-2024). Alinhado aos 11 Compromissos com a Criança, o documento oferece uma visão abrangente dos progressos alcançados e dos desafios que persistem na promoção dos direitos da criança em Angola.

Os 11 Compromissos com a Criança constituem uma referência fundamental para a promoção do bem-estar infantil e para a mobilização de esforços em torno das prioridades que mais influenciam a vida das crianças e das suas famílias. Neste sentido, a publicação constitui um importante instrumento para a formulação, monitorização e avaliação de políticas públicas, disponibilizando dados actualizados e desagregados por província e por diferentes grupos populacionais que permitem identificar desigualdades, definir prioridades e fortalecer a tomada de decisões baseada em evidências.

Os resultados revelam avanços significativos em áreas fundamentais, como saúde, educação e protecção infantil, mas também evidenciam disparidades territoriais e socioeconómicas que exigem esforços renovados para assegurar que nenhuma criança fique para trás. Responder a estes desafios e acelerar os progressos em favor da infância continua a ser uma prioridade nacional e um elemento essencial para o desenvolvimento sustentável de Angola.

O Governo de Angola tem reafirmado o seu compromisso com a promoção dos direitos da criança e com o desenvolvimento humano, em consonância com a Estratégia de Longo Prazo Angola 2050, o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, assim como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2063 da União Africana. Neste contexto, o UNICEF continua a apoiar o fortalecimento dos sistemas nacionais de dados e estatísticas, essenciais para uma governação mais eficaz e centrada nas pessoas.

Expressamos o nosso reconhecimento e agradecimento a todas as instituições, parceiros e profissionais que contribuíram para a realização do IIMS 2023-2024 e para a elaboração deste relatório temático. Esperamos que este Perfil da Criança sirva como um instrumento para a implementação de um Sistema de Indicadores da Criança Angolana (SICA) e que constitua uma referência útil para decisores, investigadores, técnicos, e todos aqueles que trabalham para melhorar a vida das crianças em Angola.

Porque investir no futuro de Angola é investir na criança.

Victor Hugo Guilherme

Ministro do Planeamento

Matthew Cummins

Representante do UNICEF em Angola

1. NOTA INTRODUTÓRIA

O Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde 2023–2024 (IIMS 2023–2024) foi realizado entre 17 de Setembro de 2023 e 31 de Janeiro de 2024, no quadro da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico (ENDE) 2015–2025, do respectivo Plano de Acção e do Plano de Actividades do Instituto Nacional de Estatística (INE) para 2023–2024. O inquérito insere-se no oitavo ciclo do Programa Internacional de Inquéritos Demográficos e de Saúde (DHS) e no sexto ciclo dos Inquéritos de Indicadores Múltiplos (MICS). A realização deste inquérito reforça o compromisso de Angola com a produção de estatísticas oficiais de qualidade, disponibilizando dados actualizados e fiáveis sobre indicadores demográficos, saúde materno-infantil, nutrição, educação e condições de vida da população.

Este inquérito foi realizado e coordenado pelo INE, em colaboração com o Ministério da Saúde (MINSA), com assistência técnica da ICF Internacional, através do Programa de Inquéritos Demográficos e de Saúde “Demographic and Health Survey” (DHS), e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O financiamento foi assegurado pelo Governo de Angola, com apoio do Banco Mundial (via projectos REDISSE IV e PFSS), bem como da USAID e do FNUAP.

Os principais resultados do IIMS 2023-2024 foram divulgados em 2025. O Instituto Nacional de Estatística, em colaboração com o UNICEF, reconhecendo a importância dos dados sobre a criança para um planeamento sensível aos seus direitos, reúne, nesta publicação, dados estatísticos para o Sistema de Indicadores da Criança em Angola (SICA), alinhados com os 11 Compromissos do Governo de Angola com a Criança e estruturados em quatro sectores basilares no desenvolvimento harmonioso da criança: i) educação, ii) saúde, iii) água e saneamento, iv) registo de nascimento, sem descurar a dimensão demográfica, essencial no processo de desenho e aplicação de políticas públicas.

Os 58 indicadores permitem avaliar o desempenho das 18 províncias na promoção do desenvolvimento infantil desde o pré-natal (através de indicadores de saúde materna), infância e adolescência; considerando factores de equidade e desigualdades socioeconómicas e geográficas.

De uma forma geral, os resultados do Perfil da Criança em Angola, com base nos dados do IIMS 2023-2024, apresentam melhoria comparativamente ao IIMS 2015-2016, embora persistam assimetrias no acesso a serviços públicos essenciais (por exemplo, acesso ao II ciclo do ensino secundário ou à assistência ao parto em unidades de saúde), bens essenciais (por exemplo, acesso à redes de mosquiteiro tratados) e o uso de boas práticas.

Importa salientar que os dados reflectem a Divisão Político-Administrativa, estabelecida pela Lei n.º 18/16, vigente à data da recolha (18 províncias), devendo este aspecto ser considerado na análise e interpretação dos resultados.

2. SUMÁRIO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS

2.1. ESTRUTURA DA POPULAÇÃO INFANTIL

As crianças e adolescentes dos 0 aos 17 anos representam uma parcela significativa da população angolana, evidenciando a juventude da estrutura demográfica do país. Em quase todas as províncias, mais de metade da população é composta por indivíduos nesta faixa etária. As maiores proporções observam-se nas províncias do Bié, Uíge e Moxico, onde cerca de 57% a 58% da população corresponde a crianças e adolescentes. Em contraste, Luanda apresenta uma proporção relativamente menor, embora concentre um elevado número absoluto de crianças devido à sua elevada densidade populacional.

2.2. REGISTO DE NASCIMENTO NAS CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS

O registo de nascimento constitui um indicador fundamental para garantir o acesso aos direitos básicos da criança. Observa-se que, a nível nacional, a proporção de crianças menores de 5 anos com registo de nascimento foi de 37,8%. Verificam-se diferenças significativas entre províncias:

- Lunda Sul, Zaire, Cuanza Sul e Moxico apresentam proporções relativamente elevadas de registo de nascimento, variando entre 47% a 71%;
- Huambo, Cunene e Bié apresentam as menores proporções entre 16% a 25%.

Estas disparidades reflectem sobretudo diferenças na disponibilidade de serviços administrativos e nas condições de acesso das populações rurais.

2.3. FREQUÊNCIA ESCOLAR

Os dados indicam que, a nível nacional, a taxa líquida de frequência escolar no ensino primário atingiu 66%. No entanto, observam-se variações relevantes entre províncias.

- Zaire (87%), Lunda Sul (80%) e Cuanza Norte (80%) apresentam as maiores taxas líquidas de frequência no ensino primário;
- Bié (44%) e Cunene (48%) apresentam as menores taxas líquidas de frequência escolar.

2.4. PREVENÇÃO CONTRA MALÁRIA

Os indicadores de saúde infantil relativos ao uso de redes mosquiteiras tratadas com insecticida, mostram que, a nível nacional, 22% das crianças de 0-4 anos dormiram debaixo de uma rede mosquiteira na noite anterior ao inquérito. Os dados, contudo, revelam assimetrias entre províncias.

- Cuanza Norte (52%), Zaire (47%) e Uíge (46%) registam as maiores proporções de crianças que dormiram debaixo de rede mosquiteira;
- Namibe (10%), Huíla (8%) e Moxico (5%) registam as menores proporções, evidenciando menor protecção das crianças contra a malária nessas regiões.

2.5. MORTALIDADE INFANTIL

A nível nacional, a mortalidade infanto-juvenil (menores de 5 anos) é de 52 óbitos por mil nascidos vivos. Verificam-se níveis bastante diferenciados entre províncias, variando de 9 óbitos por mil nascidos vivos em Malanje para 87 por mil em Cuando Cubango.

- Cuando Cubango, Benguela e Huambo registam as maiores taxas de mortalidade de menores de 5 anos;
- Malanje, Bengo e Lunda Sul registam as menores taxas.

Para além disso, a mortalidade apresenta uma clara relação com o nível de riqueza, os dados mostram que as crianças pertencentes aos agregados familiares mais pobres enfrentam um risco de morte significativamente superior ao das crianças dos agregados mais ricos.

2.6. ESTADO NUTRICIONAL DAS CRIANÇAS

A prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos é de 39,9%, da desnutrição aguda é de 5,2% e do sobrepeso de 2,8%. Os dados constantes neste relatório, revelam que as províncias com piores indicadores nutricionais tendem também a apresentar níveis elevados de mortalidade infantil e infanto-juvenil. A elevada prevalência de desnutrição crónica, especialmente nas zonas rurais e nas províncias do interior, constitui um importante factor de risco para a sobrevivência e o desenvolvimento das crianças.

- Desnutrição crónica (altura para idade): constitui o principal problema nutricional infantil no país. A prevalência nas áreas rurais é cerca de 20 pontos percentuais superior à observada na área urbana.
- Desnutrição aguda (peso para altura): as maiores prevalências são observadas nas províncias do Moxico (11,1%), Lunda Norte (9,2%) e Zaire (8,3%); enquanto que os níveis mais baixos verificam-se nas províncias do Cuanza Sul (1,4%) e Cuanza Norte (2,5%);
- Sobrepeso: o excesso de peso nas crianças menores de 5 anos permanece relativamente baixo, mas merece monitorização. As maiores prevalências observam-se nas províncias do Cuando Cubango (5,9%), Moxico (4,5%) e Bié (4,1%).

2.7. ACESSO À ÁGUA E SANEAMENTO

O acesso dos agregados familiares à água potável, às instalações sanitárias e às condições adequadas de higiene influencia profundamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população em geral e, particularmente, das crianças.

Cerca de 71% da população usa fontes apropriadas de água para beber. Os dados, contudo, revelam assimetrias entre províncias.

- Luanda (99,9%), Cabinda (89,1%), e Benguela (80,4%) registam as maiores proporções;
- Cuanza Norte (47,1%) e Uíge (34,9%) apresentam as proporções mais baixas.

Apesar dos progressos registados em vários indicadores de bem-estar infantil em Angola, persistem desigualdades provinciais acentuadas, particularmente entre províncias urbanizadas do litoral e províncias rurais do interior. Neste contexto, o reforço de políticas públicas orientadas para a educação, saúde, registo civil e acesso a serviços básicos nas áreas mais vulneráveis é determinante para promover um desenvolvimento mais equitativo das crianças.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS

A amostra do IIMS 2023–2024 baseou-se na cartografia e nos resultados do Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH) de 2014, garantindo representatividade a nível nacional, provincial, por área de residência urbana e rural e para diferentes grupos sociodemográficos. Cada província foi estratificada em áreas urbanas e rurais, totalizando 36 estratos amostrais.

A selecção da amostra foi realizada em duas etapas: na primeira, foram seleccionados 630 conglomerados com probabilidade proporcional ao tamanho, com base no número de agregados familiares identificados no RGPH 2014; na segunda, foram seleccionados sistematicamente 26 agregados familiares por conglomerado, considerando apenas os agregados familiares residentes.

Para a recolha de dados foram utilizados quatro questionários: do agregado familiar, da mulher (15–49 anos), do homem (15–54 anos) e de biometria. Estes instrumentos permitiram recolher informações sobre características sociodemográficas, saúde reprodutiva, VIH/SIDA, malária, imunização, violência doméstica, trabalho e disciplina infantil, entre outros temas relevantes. Foram igualmente recolhidos dados biométricos e laboratoriais, incluindo medições antropométricas e testes de anemia, malária, VIH e hepatite B em grupos elegíveis.

No total, foram seleccionados 16 380 agregados familiares, dos quais 16 243 foram entrevistados com sucesso, resultando numa taxa de resposta de 99%. Entre os indivíduos elegíveis, foram entrevistadas 14 717 mulheres de 15–49 anos (94%) e 6 604 homens de 15–54 anos (93%), assegurando elevada qualidade e fiabilidade dos dados recolhidos.

Os indicadores seleccionados para este relatório são, em particular, aqueles relacionados com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com os 11 Compromissos do Governo de Angola para com a Criança.

Os 17 ODS são: 1) Erradicar a fome; 2) Erradicar a pobreza; 3) Saúde de qualidade; 4) Educação de qualidade; 5) Igualdade de género; 6) Água potável e saneamento; 7) Energias renováveis e acessíveis; 8) Trabalho digno e crescimento económico; 9) Redução das desigualdades; 10) Cidades e comunidades sustentáveis; 11) Produção e consumo responsáveis; 12) Acção climática; 13) Proteger a vida marinha; 14) Proteger a vida terrestre; 15) Paz, justiça e instituições eficazes; e 16) Parcerias para a implementação dos objetivos. Entretanto este relatório inclui apenas alguns indicadores relacionados aos ODS 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 16.

Os 11 Compromissos com a Criança são: 1) Esperança de Vida ao Nascer; 2) Segurança Alimentar e Nutricional; 3) Registo de Nascimento; 4) Educação da Primeira Infância; 5) Educação Primária e Formação Profissional; 6) Justiça Juvenil; 7) Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/SIDA nas Famílias e Crianças; 8) Prevenção e Combate à Violência Contra a Criança; 9) Protecção Social e Competências Familiares; 10) A Criança e a Comunicação Social, a Cultura e o Desporto; 11) A Criança no Plano Nacional e no Orçamento Geral do Estado. Entretanto, este relatório inclui apenas alguns indicadores relacionados aos Compromissos 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9.

4. INDICADORES DOS OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) constituem um quadro global de referência para a promoção do desenvolvimento económico, social e ambiental, visando assegurar melhores condições de vida para as populações até 2030. Embora sejam universais, os ODS têm uma relevância particular para as crianças, uma vez que estas são simultaneamente um dos grupos mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, o principal investimento para o futuro. No contexto da análise da situação da criança, estes objectivos assumem particular relevância, uma vez que praticamente todos os ODS têm implicações directas ou indirectas para a infância. Assim, muitos dos seus indicadores estão directamente relacionados com o bem-estar, a sobrevivência, a educação, a saúde e a protecção da criança, reconhecendo que a infância é simultaneamente uma fase crítica do ciclo de vida e uma base determinante para o desenvolvimento sustentável futuro.

A forma como estes objetivos são alcançados determina não apenas o bem-estar actual das crianças, mas também as suas oportunidades futuras enquanto adultos. Neste sentido, os ODS reflectem de forma transversal as múltiplas dimensões dos direitos da criança, incluindo o acesso a serviços essenciais, a redução das desigualdades e a protecção contra formas de vulnerabilidade, como a pobreza, a exclusão social e o trabalho infantil.

Neste capítulo, apresentam-se de forma sistematizada os indicadores constantes nesta publicação que contribuem para o acompanhamento dos ODS, evidenciando a sua correspondência com os respectivos objectivos e metas da Agenda 2030. A organização destes indicadores em quadro sintético permite identificar, de maneira clara e estruturada, como a informação estatística disponível no Perfil da Criança em Angola contribui para o monitoramento dos compromissos internacionais assumidos pelo país no domínio do desenvolvimento sustentável, além de estar alinhado com os 11 Compromissos com a Criança em Angola.

Deste modo, este capítulo facilita a leitura integrada dos dados apresentados ao longo do relatório, ao mesmo tempo que reforça a importância das estatísticas sobre a criança como instrumento fundamental para o seguimento, avaliação e formulação de políticas públicas alinhadas com os ODS. Importa destacar que esta publicação reúne apenas indicadores seleccionados, visando proporcionar uma visão sintética da situação da criança em Angola.

Quadro 1 - Indicadores dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à criança

Objectivo	Metas	Indicador ODS	Indicador Perfil da Criança
1. Erradicar a Pobreza	1.4. Até 2030, visa assegurar que todos os homens e mulheres, em particular os pobres e os vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos Económicos, bem como acesso aos serviços básicos, propriedade e controlo sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo Microfinanças.	1.4.1 Proporção da população a viver em agregados familiares com acesso a serviços.	D01. Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber: Total: 70,9% Urbana: 91,8% Rural: 37,5%
			D02. Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber Total: 27,9% Urbana: 40,7% Rural: 7,6%
			D03. Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas Total: 44,4% Urbana: 60,1% Rural: 19,5%
			D04. Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas Total: 23,7% Urbana: 32,1% Rural: 10,3%

Continua na página seguinte

Objectivo	Metas	Indicador ODS	Indicador Perfil da Criança
2. Erradicar a fome	2.1 Até 2030, visa acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável.	2.2.2 Prevalência de malnutrição nas crianças com menos de 5 anos de idade, por tipo de malnutrição (baixo peso e excesso de peso)	C26. Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos: Total: 39,9% Homens: 43,8% Mulheres: 36,3%
			C27. Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos Total: 5,2% Homens: 6,0% Mulheres: 4,4%
			C28. Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos Total: 2,8 % Homens: 3,6% Mulheres: 1,9%
3. Saúde de qualidade	3.1. Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 000 nascidos vivos	3.1.1. Taxa de mortalidade materna	C29. Taxa de mortalidade materna Total: 0,28
		3.1.2 Proporção de partos assistidos por pessoal de saúde qualificado	C07. Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde Total: 45,8% Urbana: 69,5% Rural: 19,1%
	3.2. Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com todos os países objectivando reduzir a mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1 000 nascidos vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 anos para pelo menos 25 por 1 000 nascidos vivos.	3.2.1 Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos (por 1 000 nascidos vivos)	A10. Taxa de mortalidade infanto-juvenil Total: 52 Masculino: 58 Feminino: 47
		3.2.2. Taxa de mortalidade neonatal (por 1 000 nascidos vivos)	A11. Taxa de mortalidade neonatal Total: 14 Masculino: 16 Feminino: 18
	3.3. Até 2030, acabar com as epidemias de sida, tuberculose, malária e Doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis.	3.3.1. Número de novos casos de infeção por VIH por 1 000 habitantes, por sexo, grupo etário e populações específicas	C14. Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade Total: 1,6% Masculino: 0,8% Feminino: 2,2% Prevalência do VIH na população de 15-19 anos de idade Total: 0,5% Masculino: 0,4% Feminino: 0,7%
		3.3.3 Incidência da Malária por 1 000 habitantes	C04. Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (proxy) Total: 11,6% Masculino: 11,7% Feminino: 11,4%
		3.7.2 Taxa de fecundidade na adolescência	Número de nascidos-vivos de mães adolescentes (grupo etário 15-19) por 1 000 mulheres deste grupo etário Total: 122
	Meta 3.7 - Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planeamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais		

Objectivo	Metas	Indicador ODS	Indicador Perfil da Criança
	3.b. Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças transmissíveis e não transmissíveis, que afectam principalmente os países em desenvolvimento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, de acordo com a declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento de utilizarem plenamente as Disposições do acordo tripartite sobre flexibilidades para proteger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos.	3.b.1 Proporção da população alvo abrangida por todas as vacinas incluídas no seu programa nacional	C20. Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (proxy) Total: 72,5% Masculino: 70,9% Feminino: 74,1%
4. Educação de qualidade	4.2. Até 2030, garantir que todos os rapazes e raparigas tenham acesso a Um desenvolvimento de qualidade na primeira fase da infância, bem como Cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam preparados para o Ensino primário.	4.2.1 Proporção de crianças com menos de 5 anos de idade que estão dentro dos parâmetros de desenvolvimento em termos de saúde, aprendizagem e bem-estar psicossocial, por sexo	B01. Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino pré-primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) Total: 19,9% Masculino: 19,4% Feminino: 20,5%
		4.2.2 Taxa de participação em actividades de aprendizagem organizada (um ano antes da idade oficial de entrada para o 1º ciclo), por sexo	B04. Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário Total: 66,2% Masculino: 66,3% Feminino: 66,2%
	4.3. Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo à universidade	4.3.1 Taxa de participação de jovens e adultos na educação formal e não formal nos últimos 12 meses, por sexo	B05. Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário Total: 39,7% Masculino: 40,2% Feminino: 39,2%
5. Igualdade de género	5.2 Até 2030 eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e raparigas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos de exploração	5.2.1 Proporção de mulheres e raparigas de 15 ou mais anos de idade que sofreram violência física, sexual ou psicológica pelo cônjuge/parceiro actual/anterior nos últimos 12 meses	Percentagem de mulheres com 15-19 que sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro actual ou ex-parceiro nos últimos 12 meses Total: 29,8%
		5.2.2 Proporção de mulheres e raparigas de 15 anos ou mais que foram objeto de violência sexual por outras pessoas que não parceiras íntimas nos últimos 12 meses, por idade e local de ocorrência	Percentagem de mulheres com 15-19 que sofreram violência sexual por alguém que não esposo ou parceiro íntimo nos últimos 12 meses Total: 0,7%
8. Trabalho digno e crescimento económico	Meta 8.6 Até 2030, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem Emprego, educação ou formação	8.6.1 Proporção de jovens de 15-24 anos não empregados que não frequentam à escola e não estão em treinamento	B11. Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha Total: 11,5% Masculino: 9,4% Feminino: 13,5%
	8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e garantir a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e uso de crianças-soldados e, até 2025, acabar com o trabalho Infantil em todas as suas formas	8.7.1 Proporção e número de crianças de 5-17 anos envolvidas em trabalho infantil (actividades económicas e tarefas domésticas)	G01. Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora Total: 8,8% Masculino: 8,7% Feminino: 8,9% G02. Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora Total: 9,1% Masculino: 9,0% Feminino: 9,2%



QUADROS DE RESULTADOS





ANGOLA

INDICADORES ANGOLA

Quadro 2 – Indicadores-Chave Angola relacionados aos 11 Compromissos com a Criança

Indicadores-Chave		Angola	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	36 604 681	23 991	12 613	17 931	18 672	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	16,2	14,3	19,2	16,7	15,7	18,1	18,5	17,7	19,0	20,1
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	37,1	36,2	38,6	38,3	36,1	38,5	37,9	39,1	39,7	35,8
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	21,4	23,7	18,5	n.a	n.a	18,0	19,4	21,6	24,5	26,0
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	11,9	5,5	25,7	n.a	n.a	24,4	26,3	12,4	3,9	1,3
A06.	Proporção de mulheres com 15-19 anos de idade que já esteve grávida (%)	27,1	20,0	42,5	n.a	n.a	39,6	47,5	32,7	19,5	8,2
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	2,2	0,8	5,0	n.a	n.a	4,5	4,2	2,1	1,0	0,8
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	4,8	3,8	6,9	na	na	7,3	6,7	5	3,4	2,8
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	32,0	29,0	34,0	35	29	33	40	29	23	22
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	52,0	45,0	61,0	58	47	57	70	52	36	27
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	16,0	16,0	17,0	18	14	17	22	15	10	14
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	15,0	14,0	17,0	16	15	16	18	14	13	8
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	21,0	16,0	28,0	24	19	26	31	24	13	6
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	19,9	25,7	13,2	19,4	20,5	10,9	16	18,7	27,5	36,2
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	86,3	95,1	67,7	n.a	n.a	55,7	75,7	88,6	97,4	97,5
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	73,4	88,8	38,5	n.a	n.a	24,1	47,1	78,2	93,0	97,7
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	66,2	76,3	52,4	66,3	66,2	39,5	60,9	70,6	82,1	85,9
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	39,7	53,0	15,8	40,2	39,2	7,5	18,1	38,4	54,7	69,9
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	23,3	14,0	37,7	22,7	23,8	50,8	29,0	18,1	10,9	6,9
B07.	População dos 5-11 anos fora do sistema de ensino (*)	2 414 228	943 118	1 471 110	1 215 434	1 198 795	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Indicadores-Chave		Angola	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B08.	População dos 12-14 anos fora do sistema de ensino (*)	798 929	315 468	483 460	399 475	399 454	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
B09.	População dos 15-18 anos fora do sistema de ensino (*)	1 286 455	577 404	709 051	592 113	694 342	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	0,0	1,0	3,0	4,0	5,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	11,5	12,7	9,4	9,4	13,5	11,1	10,3	13,2	10,9	11,6
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	5,4	7,3	0,7	n.a	n.a	0,4	0,9	4,5	6,8	9,6
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	4,1	5,7	0,5	n.a	n.a	0,2	0,6	3,2	6,9	7,1
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	40,5	53,3	10,0	n.a	n.a	2,5	10,7	37,0	54,2	65,7
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	26,1	36,4	3,3	n.a	n.a	0,5	2,5	19,2	38,6	53,6
B16.	Índice de Desenvolvimento da Primeira Infância para crianças de 24- 59 meses (%)	45,2	53,9	34,4	44,2	46,1	30,1	36,2	47,8	58,0	65,5
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira(%)	35,5	36,7	33,7	n.a	n.a	22,3	42,3	42,2	39,5	32,7
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	21,8	22,3	21,2	22,6	21,1	14,3	27,8	24,9	22,0	19,5
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	23,9	20,4	28,5	n.a	n.a	16,4	33,3	25,1	21,7	18,2
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	11,6	11,1	12,1	11,7	11,4	11,5	13,0	12,7	10,1	9,1
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	49,4	64,6	32,2	n.a	n.a	24,5	39,3	57,9	70,5	76,2
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	22,4	9,9	36,5	n.a	n.a	46,7	27,9	11,5	6,9	3,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	45,8	69,5	19,1	n.a	n.a	nd	nd	nd	nd	nd
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	33,7	42,4	12,9	n.a	n.a	9,3	14,9	29,0	47,1	46,8
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	24,6	31,5	9,2	n.a	n.a	5,8	11,8	26,4	31,2	38,1
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	48,6	72,4	21,5	n.a	n.a	15,3	26,5	62,2	82,2	90,3

Indicadores-Chave		Angola	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	52,7	62,4	30,5	n.a	n.a	21,7	34,1	50,0	61,7	72,6
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais(%)	44,8	56,4	20,6	n.a	n.a	15,1	24,4	45,9	58,0	66,4
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	1,6	1,9	0,9	0,8	2,2	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	88,4	88,6	88,3	87,7	89,1	86,0	89,5	88,5	92,0	86,4
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	17,4	6,5	30,8	17,2	17,6	31,0	29,6	13,1	3,2	1,7
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	1,8	2,1	1,5	1,4	2,3	1,6	1,3	2,3	1,9	2,5
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	13,1	14,3	11,8	13,5	12,8	11,0	12,3	15,7	14,6	12,4
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	22,5	28,2	15,8	22,5	22,6	14,7	16,9	22,1	30,5	37,6
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	72,5	89,4	54,7	70,9	74,1	46,6	63,1	85,2	91,7	97,2
C21.	Prevalência da anemia severa nas crianças dos 6-59 meses de idade (%)	2,6	1,8	3,6	2,8	2,5	3,7	3,8	2,4	1,4	1,1
C22.	Prevalência do VIH nos jovens dos 15-24 anos de idade (%)	0,8	0,9	0,4	0,4	1,0	0,7	0,4	1,6	0,7	0,5
C24.	Taxa de mortalidade materna de mulheres dos 15- 49 anos de idade	0,28	nd	nd	na	na	nd	nd	nd	nd	nd
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	43,3	54,6	26,4	na	na	21,2	29,3	42,6	59,4	64,8
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	39,9	30,9	50,9	43,8	36,3	52,5	49,4	39,4	26,7	23,3
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	5,2	5,7	4,6	6,0	4,4	5,2	4,0	5,3	5,7	6,4
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	2,8	2,2	3,4	3,6	1,9	3,4	3,7	2,3	1,8	2,2
C29.	Proporção da população que pratica a defecação a céu aberto (%)	27,7	5,2	63,5	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	70,9	91,8	37,5	70,8	70,9	30,2	46,3	83,6	95,8	98,4
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	27,9	40,7	7,6	27,9	28,0	3,4	8,1	25,1	44,5	58,6
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	44,4	60,1	19,5	45,2	43,8	5,1	28,0	41,5	61,0	86,7
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	23,7	32,1	10,3	23,2	24,1	5,2	20,9	42,5	36,9	12,8
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	92,8	94,8	87,4	na	na	86,1	89,7	93,0	94,0	96,1
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	53,9	82,3	11,2	n.a	n.a	1,1	10,9	70,6	98,3	99,8
D07.	Número de agregados familiares que receberam apoio social de alguma entidade (Projecto Kwenda, ONG's ou outra entidade) (*)	1 484 768	670 674	814 094	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	76,7	78,5	73,9	na	na	73,5	74,8	79,0	79,1	77,3

Indicadores-Chave		Angola	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	53,7	80,6	10,9	n.a	n.a	0,1	8,2	62,9	97,3	99,9
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento(%)	37,8	48,5	25,1	38,3	37,4	18,0	32,8	39,1	49,1	66,4
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	73,9	84,7	56,9	74,1	73,6	42,3	67,2	79,7	87,4	93,4
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	8,8	7,2	10,8	8,7	8,9	9,5	11,6	9,2	5,9	6,6
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	9,1	7,5	11,4	9,0	9,2	10,1	12,2	9,8	6,0	6,7
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	8,8	9,1	8,3	8,9	8,7	9,6	8,8	7,9	9,3	8,2
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	9,6	10,7	7,9	9,6	9,5	8,5	9,4	10,0	11,1	8,7
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar(%)	11,5	6,0	18,9	12,0	11,0	18,6	16,7	10,0	5,6	4,6
G06.	Proporção de crianças de 1–14 anos que experimentaram qualquer método de disciplina violenta (Inclui agressão psicológica e/ou qualquer castigo físico) (%)	67,3	65,7	69,5	67,7	67,0	67,5	69,5	71,5	67,7	58,0
G07.	Proporção de crianças de 15 - 17 anos que experimentaram algum tipo de violência física ou sexual (%)	nd	nd	nd	30,1	22,3	nd	nd	nd	nd	nd
G08.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio, sem sinais de ansiedade ou depressão (%)	5,3	nd	nd	5,2	5,3	nd	nd	nd	nd	nd
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	27,3	23,7	32,6	28,3	26,3	34,0	30,0	27,5	21,9	22,0

Legenda:

- n.a Não aplicável
- n.d Não disponível
- n.f Estimativa não fiável
- * Censo 2024, resultados definitivos
- ¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio
- ² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH
- ³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).
- ⁴ Considera-se os seguintes domínios funcionais: Ver, Ouvir, Caminhar, Cuidados pessoais, Comunicação, Aprendizagem, Lembrar-se, Concentrar-se, Aceitar mudanças, Controlar o comportamento, Fazer amigos, Ansiedade e Depressão



CABINDA

INDICADORES CABINDA

Quadro 3 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província de Cabinda

Indicadores-Chave		Cabinda	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000` de pessoas) (*)	903 370	787 740	115 630	448 053	455 317	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	20,6	20,9	19,1	21,0	20,1	14,3	21,1	24,4	20,7	18,0
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	36,0	35,9	36,2	37,5	34,5	40,0	37,0	34,7	35,9	36,3
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	25,3	26,1	21,8	n.a	n.a	17,1	23,3	24,2	26,3	25,5
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	14,4	11,0	27,2	n.a	n.a	100,0	28,1	26,7	14,7	5,9
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	1,3	0,0	6,9	n.a	n.a	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	3,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	25	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	53	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	17	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	29	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	31,5	27,1	6,3	18,4	27,1	0,0	0,0	17,4	25,9	32,1
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	89,2	94,7	68,9	n.a	n.a	0,0	62,6	68,1	98,3	97,5
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	90,4	93,2	80,0	n.a	n.a	0,0	100,0	83,1	88,6	94,9
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	74,5	nd	nd	73,2	76,0	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	54	nd	nd	50,8	56,9	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	11,3	9,5	18,3	11,1	11,6	35,2	24,4	18	12,3	4,7

Indicadores-Chave		Cabinda	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade	3,0	4,0	3,0	3,0	4,0	n.d	2,0	2,0	3,0	5,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	16,3	18,5	6,3	14,0	18,4	0,0	7,5	14,6	18,9	16,5
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,7	1,4	3,0	n.a	n.a	0,0	0,0	3,3	0,0	2,3
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,7	2,1	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	1,8	2,7
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	64,9	73,1	29,5	n.a	n.a	0,0	0,0	37,0	70,6	75,7
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	39,0	45,3	10,9	n.a	n.a	0,0	0,0	23,4	35,8	56,4
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	56,5	58,7	48,3	n.a	n.a	72,6	44,8	53,0	58,4	59,1
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	16,5	14,2	25,2	20,7	12,2	16,0	27,2	21,1	10,5	16,2
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	14,7	16,7	6,1	n.a	n.a	nf	0,0	18,8	3,4	26,3
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	16,3	15,2	21,0	16,6	16,0	42,0	24,2	13,2	14,8	17,0
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	86,4	88,7	76,7	n.a	n.a	17,4	71,2	78,6	91,6	94,7
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	3,4	1,8	10,6	n.a	n.a	82,6	0,0	4,4	1,1	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	87,1	90,2	73,6	n.a	n.a	0,0	74,5	84,6	91,1	93,4
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual² e as principais concepções erradas³ sobre o VIH e SIDA (%)	34,5	35,1	31,8	n.a	n.a	0,0	35,9	14,0	39,9	38,2
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual² e as principais concepções erradas³ sobre o VIH e SIDA (%)	44,3	48,1	27,4	n.a	n.a	0,0	12,5	42,5	42,0	54,0
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	86,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	41,9	43,9	33,3	n.a	n.a	0,0	14,3	22,7	35,7	54,3
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos	26,1	30,1	8,7	n.a	n.a	0,0	2,6	15,3	25,5	36,4

Indicadores-Chave		Cabinda	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
	especiais (%)										
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	1,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	64,4	62,0	74,9	66,4	62,4	72,5	78,5	74,8	65,9	52,2
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	16,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,9	1,2	0,0	1,5	0,4	0,0	0,0	0,8	0,8	1,5
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	14,8	16,2	9,0	12,7	16,8	26,0	9,0	21,5	13,1	11,9
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	30,3	32,8	19,8	32,3	28,3	20,2	13,9	24,5	32,6	37,2
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	79,6	86,4	49,9	70,7	88,1	nf	6,3	80,7	93,0	86,4
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	50,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	29,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	4,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	2,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	89,1	93,7	71,6	88,3	90,0	3,3	64,1	89,4	91,3	94,0
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	30,0	31,3	24,7	28,8	31,1	59,6	18,8	22,1	30,1	34,9
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	46,3	42,6	60,7	48,6	44,1	69,7	54,2	31,9	24,2	66,8
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	48,2	52,5	31,7	47,0	49,4	30,3	36,9	57,3	69,2	31,5
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	100,0	100,0	100,0	na	na	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	85,3	97,2	40,9	n.a	n.a	nf	3,5	73,8	99,7	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	46,9	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	79,4	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	37,8	48,5	25,1	38,3	37,4	18,0	32,8	39,1	49,1	66,4
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	73,9	84,7	56,9	74,1	73,6	42,3	67,2	79,7	87,4	93,4
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate à Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	1,7	1,7	1,8	1,3	2,1	0,0	1,3	1,5	0,7	2,6
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	2,2	2,1	2,4	2,0	2,3	0,0	2,2	1,8	1,3	3,0
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	6,5	5,5	10,1	6,7	6,2	0,0	7,3	10,4	4,8	5,7

Indicadores-Chave		Cabinda	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	6,6	6,2	8,3	5,4	8,0	0,0	6,9	6,7	7,3	6,4
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	5,5	1,7	16,8	3,3	7,7	0,0	33,1	5,6	2,4	1,9
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	12,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

- n.a Não aplicável
- n.d Não disponível
- n.f Estimativa não fiável
- * Censo 2024, resultados definitivos
- ¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio
- ² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH
- ³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



ZAIRE

INDICADORES ZAIRE

Quadro 4 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província do Zaire

Indicadores-Chave		Zaire	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	682 658	519 044	163 614	448 053	455 317	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	19,3	18,0	22,8	21,1	17,5	33,3	22,2	17,5	16,5	18,9
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	36,4	37,0	34,4	38,2	34,8	32,7	37,1	34,4	38,0	36,9
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	21,9	23,7	16,4	n.a	n.a	17,0	16,9	21,1	24,4	24,6
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	9,0	3,4	19,0	n.a	n.a	0,0	0,0	18,2	15,1	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	0,0	0,0	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	3,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	20	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	14	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	32,2	22,4	24,0	27,1	15,4	33,3	15,4	20,0	21,4	42,9
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	84,0	87,3	74,6	n.a	n.a	0,0	85,7	81,4	88,6	97,6
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	89,0	93,9	83,0	n.a	n.a	0,0	82,3	86,0	97,6	100,0
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	86,5	nd	nd	82,7	89,6	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	51,8	nd	nd	56,6	46,2	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	11,0	7,3	15,9	10,9	11,0	42,4	10,5	9,1	7,6	4,2
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade	3,0	4,0	3,0	4,0	3,0	1,0	3,0	3,0	4,0	5,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	5,1	5,5	3,4	4,9	5,3	4,8	2,6	5,5	5,1	6,4

Indicadores-Chave		Zaire	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação1 pelo menos, uma vez por semana (%)	8,4	14,9	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	7,9	17,3	18,5
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação1 pelo menos, uma vez por semana (%)	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	51,8	68,0	30,9	n.a	n.a	0,0	30,2	56,4	68,6	86,8
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	14,9	24,2	0,0	n.a	n.a	0,0	0,9	5,4	23,4	43,1
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	55,9	46,2	66,9	n.a	n.a	57,1	73,8	52,1	43,0	47,2
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	47,0	35,0	58,9	52,8	40,5	62,2	54,8	43,8	38,8	30,9
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	49,3	52,5	45,5	n.a	n.a	38,4	100,0	38,8	50,6	40,9
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	15,6	10,9	20,2	11,5	19,8	15,7	17,6	18,2	10,7	10,4
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	54,5	56,7	52,2	n.a	n.a	46,3	71,5	29,7	52,4	88,7
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	13,5	8,0	19,0	n.a	n.a	29,9	13,5	17,1	5,8	2,9
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	74,3	86,5	63,1	n.a	n.a	46,7	59,1	84,7	90,1	88,7
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	18,7	22,0	14,4	n.a	n.a	0,0	15,3	26,9	20,4	14,0
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	33,3	36,6	28,0	n.a	n.a	39,2	10,4	34,9	44,1	36,6
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	64,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	80,1	87,3	71,0	n.a	n.a	92,2	56,3	94,9	87,9	82,4
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	61,9	69,5	49,9	n.a	n.a	52,3	51,7	61,2	72,2	64,6
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	0,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	97,7	95,1	100,0	96,7	98,8	100,0	100,0	99,0	94,6	89,9
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	21,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Zaire	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,0	0,5	0,7	0,0	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	9,9	6,3	13,4	8,0	11,8	24,2	14,0	6,8	2,9	4,8
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	11,5	10,4	12,6	7,7	15,4	0,0	19,4	9,6	8,0	11,3
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	89,2	95,8	84,7	78,9	100,0	79,5	100,0	81,0	93,4	87,8
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	30,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	41,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	8,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	2,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	57,7	90,2	20,4	57,0	58,3	2,4	37,7	50,8	92,7	96,7
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	14,8	23,4	4,9	14,9	14,6	0,0	5,3	7,7	28,0	39,8
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	30,1	43,0	15,4	30,0	30,3	0,0	19,8	28,2	38,1	66,7
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	27,9	48,5	4,3	27,4	28,3	0,0	6,9	33,9	57,0	31,7
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	74,5	82,6	58,1	na	na	66,7	85,1	56,8	84,5	78,3
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	67,0	91,8	39,3	n.a	n.a	nf	23,8	92,1	100,0	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	57,6	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	39,3	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	47,7	47,8	47,6	44,7	51,2	47,5	47,1	45,4	49,0	54,1
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	89,7	91,1	87,8	89,5	89,9	74,3	86,2	89,7	94,6	96,7
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate à Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	13,8	11,4	16,7	15,1	12,5	17,2	9,4	21,1	12,8	8,2
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	15,0	12,8	17,8	15,1	14,8	18,0	10,7	21,6	14,5	9,8
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	13,4	9,8	17,8	13,6	13,2	17,6	16,8	14,4	8,0	10,0
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma	13,9	10,9	17,9	14,3	13,4	11,3	19,5	14,1	10,4	8,7

Indicadores-Chave		Zaire	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
	vez frequentou a escola (%)										
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	1,5	2,0	1,0	2,0	1,2	0,0	1,0	2,0	1,4	2,6
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	46,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

- n.a Não aplicável
- n.d Não disponível
- n.f Estimativa não fiável
- * Censo 2024, resultados definitivos
- ¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio
- ² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH
- ³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH)

INDICADORES UÍGE

Quadro 5 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província do Uíge

Indicadores-Chave		Uíge	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	2 017 921	1 042 302	975 620	1 001 154	1 016 767	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	18,0	18,7	17,6	16,4	19,7	16,7	17,1	22,8	13,5	21,4
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	42,3	42,2	42,4	46,7	38,2	43,5	41,6	42,7	43,8	36,2
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	18,6	22,4	16,5	n.a	n.a	16,5	17,8	19,0	23,0	27,7
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	14,9	9,5	19,5	n.a	n.a	25,8	13,5	16,6	8,5	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	1,5	0,0	2,9	n.a	n.a	5,3	1,5	0,0	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	6,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	42	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	58	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	28	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	14	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	17	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	16,5	20,9	12,4	16,9	12,7	15,9	9,8	28,6	12,5	0,0
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	68,1	86,8	50,0	n.a	n.a	36,7	51,7	91,7	100,0	94,8
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	94,9	97,9	91,6	n.a	n.a	85,5	100,0	96,0	88,9	100,0
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	76,8	nd	nd	77	76,8	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	33,9	nd	nd	37,4	30,0	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Uíge	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	21,3	11,9	26,7	19,2	23,7	34,5	22,5	12,47	9,857	2,8
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	2,0	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	10,8	14,6	7,7	7,4	14,4	8,1	9,5	10,6	20,6	11,7
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	2,3	4,9	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	3,4	12,0	0,0
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	3,4	6,1	1,0	n.a	n.a	0,0	0,0	7,9	8,4	4,7
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	29,5	44,6	15,8	n.a	n.a	14,8	11,0	38,9	73,6	49,5
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	13,9	25,8	3,5	n.a	n.a	0,0	1,3	15,2	21,9	73,4
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	60,8	64,9	58,7	n.a	n.a	53,1	62,5	62,5	71,6	64,4
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	45,5	47,8	44,3	42,9	48,1	42,1	48,7	47,0	48,4	23,4
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	53,6	59,9	49,7	n.a	n.a	33,5	59,4	69,6	100,0	19,1
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	32,0	34,3	30,7	30,5	33,5	30,8	30,2	39,6	30,7	21,3
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	43,7	53,6	38,1	n.a	n.a	30,1	46,0	48,8	62,0	49,7
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	16,2	5,5	22,2	n.a	n.a	26,3	19,5	2,3	11,5	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	45,5	67,9	33,1	n.a	n.a	25,3	33,5	74,1	79,8	73,5
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	26,4	32,8	20,6	n.a	n.a	15,5	23,7	31,7	29,4	42,9

Indicadores-Chave		Uíge	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	15,1	23,5	7,7	n.a	n.a	7,6	9,6	17,6	31,7	21,9
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	38,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	51,6	65,3	40,9	n.a	n.a	35,1	41,7	59,9	83,8	75,2
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	39,2	61,9	22,5	n.a	n.a	9,3	31,2	56,8	75,7	67,5
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	1,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	90,3	94,0	88,2	88,2	91,9	87,2	94,0	90,1	86,6	84,7
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	39,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,8	1,5	0,5	1,2	0,5	1,0	0,0	2,0	1,7	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	17,0	23,2	13,5	16,2	17,8	10,1	17,6	25,7	25,4	0,0
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	20,8	27,5	17,1	15,9	25,7	13,2	20,4	29,2	23,9	33,7
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	88,7	100,0	82,3	84,3	92,6	61,7	96,8	100,0	100,0	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	35,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	47,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	6,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	0,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	34,9	72,8	13,3	34,2	35,6	3,5	23,2	56,1	87,2	89,2
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	10,9	22,9	4,0	10,5	11,3	2,3	6,9	20,2	24,7	21,7
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	37,6	58,6	25,6	37,7	37,5	4,8	37,7	50,3	68,0	89,2
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	22,1	39,8	12,0	21,7	22,5	5,7	23,9	40,1	32,0	10,8

Indicadores-Chave		Uíge	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	100,0	100,0	100,0	na	na	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	23,0	58,0	5,2	n.a	n.a	nf	1,5	47,4	99,2	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	84,9	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	25,2	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	39,3	52,7	32,5	39,6	39,1	18,9	40,9	48,3	71,1	61,7
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	80,9	89,8	75,7	81,4	80,2	60,2	85,4	88,6	94,2	96,3
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	4,3	3,6	4,7	3,8	4,9	2,0	2,8	6,8	10,8	5,9
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	4,7	3,8	5,1	4,1	5,3	2,4	3,2	6,4	9,1	10,7
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	9,7	10,4	9,4	10,5	8,9	10,9	9,0	7,1	11,6	15,1
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	12,5	15,1	11,1	14,3	10,5	13,9	11,3	11,0	14,6	12,5
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	33,1	21,8	38,9	34,6	31,4	50,3	30,2	31,5	13,3	4,4
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	48,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável

n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



LUANDA

INDICADORES LUANDA

Quadro 6 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província de Luanda

Indicadores-Chave		Luanda	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000` de pessoas) (*)	10 188 967	9 979 022	209 945	5 011 347	5 177 620	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	17,4	17,8	13,8	19,3	15,7	14,3	10,3	13,1	18,8	19,5
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	32,6	32,3	37,2	32,4	32,8	33,3	32,3	34,3	34,1	30,8
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	26,0	26,3	21,2	n.a	n.a	22,2	20,5	24,4	27,0	26,2
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	2,2	1,6	14,2	n.a	n.a	0,0	15,0	3,5	3,0	0,5
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	1,2	0,7	8,8	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	1,5	1,2
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	3,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	25	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	39	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	16	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	15	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	25,7	20,5	37,5	23,6	20,0	100,0	0,0	10,0	19,5	30,4
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	92,0	92,4	85,1	n.a	n.a	50,0	70,3	75,6	93,0	98,7
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	97,9	98,2	94,0	n.a	n.a	100,0	68,4	95,4	100,0	97,4
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	75,1	nd	nd	74,6	75,7	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	55,0	nd	nd	53,8	56,2	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	11,6	11,3	16,1	13,2	10,0	27,0	20,1	19,06	12,73	6,9

Indicadores-Chave		Luanda	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	4,0	4,0	3,0	4,0	4,0	1,0	3,0	2,0	4,0	5,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	16,5	16,6	14,6	16,2	16,8	42,9	11,4	21,8	14,4	16,4
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	9,3	9,8	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	8,7	12,1
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	6,9	7,0	4,7	n.a	n.a	0,0	7,7	2,4	8,1	7,5
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	58,6	59,4	41,8	n.a	n.a	0,0	36,9	50,9	52,4	66,2
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	47,3	48,3	22,1	n.a	n.a	0,0	,0	28,6	46,9	56,7
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	23,9	23,3	36,5	n.a	n.a	6,0	20,3	26,9	25,1	22,3
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	10,8	10,0	20,9	12,5	9,3	0,0	12,2	8,5	10,2	12,7
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	9,0	6,8	30,0	n.a	n.a	0,0	0,0	4,5	8,5	14,2
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	9,3	8,6	18,8	9,5	9,1	28,6	14,0	12,0	8,7	7,4
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	70,2	71,5	47,9	n.a	n.a	0,0	38,9	63,6	71,2	78,2
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	9,8	9,5	15,5	n.a	n.a	66,7	24,1	15,7	9,0	3,9
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	76,5	79,8	24,8	n.a	n.a	0,0	14,9	75,1	71,5	90,8
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual² e as principais concepções erradas³ sobre o VIH e SIDA (%)	50,8	52,2	20,1	n.a	n.a	0,0	0,0	42,0	54,8	50,5
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual² e as principais concepções erradas³ sobre o VIH e SIDA (%)	33,4	33,9	20,5	n.a	n.a	0,0	14,3	26,2	31,8	38,4

Indicadores-Chave		Luanda	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	78,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	65,3	66,4	40,1	n.a	n.a	0,0	27,7	49,6	61,1	73,1
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	60,4	61,0	47,0	n.a	n.a	0,0	35,7	49,3	57,2	67,9
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	1,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	92,5	92,4	94,5	92,8	92,3	100,0	100,0	90,2	96,1	89,8
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	2,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	4,0	4,0	3,6	2,1	5,8	0,0	0,0	6,3	3,3	3,7
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	14,5	14,1	19,7	13,8	15,0	28,6	12,7	19,6	14,2	11,5
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	35,2	35,6	29,6	38,2	32,2	0,0	23,0	28,2	36,5	40,1
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	93,5	93,9	87,9	92,8	94,2	100,0	75,9	86,9	90,0	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	63,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	23,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	6,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	2,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	99,9	99,9	100,0	99,9	99,9	100,0	100,0	99,9	99,7	100,0
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	58,6	59,3	44,9	58,5	58,6	34,2	21,2	42,6	57,2	67,7
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	70,3	71,1	55,8	71,1	69,6	0,0	27,8	46,7	63,4	87,2
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	27,1	27,9	13,2	26,3	28,0	0,0	28,6	48,3	36,1	12,8

Indicadores-Chave		Luanda	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	92,0	93,0	67,7	na	na	63,1	77,4	83,4	90,9	96,1
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	92,6	95,7	29,3	n.a	n.a	nf	4,1	77,9	98,9	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	74,8	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar(%)	94,9	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	44,6	46,9	12,5	46,3	42,9	14,3	0,0	22,2	41,0	65,5
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	79,9	81,4	56,5	78,9	80,8	41,7	21,4	60,3	79,6	91,8
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	8,1	7,2	19,3	7,8	8,4	0,0	16,1	14,7	5,6	6,5
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	8,2	7,4	18,8	7,9	8,5	0,0	17,1	15,9	5,8	6,2
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos(%)	7,1	7,1	7,5	6,7	7,5	3,1	7,3	4,6	7,6	7,8
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	7,6	7,7	7,4	5,9	9,3	0,0	7,0	6,4	8,2	7,8
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar(%)	4,5	4,3	6,2	3,5	5,6	0,0	0,0	0,0	5,7	5,4
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	25,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

- n.a Não aplicável
- n.d Não disponível
- * Censo 2024, resultados definitivos
- ¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio
- ² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH
- ³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



CUANZA NORTE

INDICADORES CUANZA NORTE

Quadro 7 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província do Cuanza Norte

Indicadores-Chave		Cuanza Norte	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	659 097	445 950	213 147	324 984	334 113	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	19,6	19,5	19,7	18,6	20,5	25,0	18,0	16,9	21,6	23,1
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	36,6	38,0	34,5	38,8	34,5	33,5	36,0	37,7	38,7	34,8
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	21,4	24,1	17,5	n.a	n.a	16,5	20,2	21,3	26,8	23,0
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	28,7	10,9	49,9	n.a	n.a	63,1	38,9	11,9	9,7	8,4
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	4,9	1,4	8,1	n.a	n.a	0,0	10,7	0,0	5,8	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	6,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	40	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	70	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	24	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	16	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	31	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	38,6	12,5	28,6	16,7	24,5	40,0	22,6	10,3	8,3	20,0
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	59,2	79,8	34,8	n.a	n.a	31,5	36,2	79,7	87,7	89,2
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	82,4	84,1	81,0	n.a	n.a	78,3	85,9	82,4	75,3	100,0

Indicadores-Chave		Cuanza Norte	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	79,8	nd	nd	79,7	79,9	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	29,5	nd	nd	32,6	25,0	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	16,5	14,0	18,1	13,3	20,2	17,0	19,6	15,72	8,762	11,5
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	2,0	3,0	4,0	4,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	8,9	11,0	3,8	6,5	11,6	3,0	7,9	12,0	6,4	12,5
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,2	2,6	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	1,8	0,0	14,8
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,6	2,5	0,5	n.a	n.a	0,0	0,7	0,9	4,4	3,9
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	24,2	45,8	6,4	n.a	n.a	0,0	12,2	32,2	67,5	77,0
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	18,2	31,9	2,4	n.a	n.a	3,5	1,4	20,6	48,2	39,3
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	64,0	72,3	60,0	n.a	n.a	48,2	65,5	73,3	78,2	75,2
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	51,5	66,2	45,5	52,5	50,5	38,4	45,8	72,0	68,2	73,2
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	65,2	69,8	64,1	n.a	n.a	37,9	67,5	79,6	87,6	n.d
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	10,3	13,7	8,9	10,6	10,0	10,7	9,1	12,5	14,5	4,8
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	59,7	87,3	47,8	n.a	n.a	46,5	49,0	83,3	97,1	83,7
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	26,0	4,4	35,5	n.a	n.a	32,9	38,5	1,3	0,0	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	32,2	76,1	13,2	n.a	n.a	15,6	13,6	70,4	87,4	72,9
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	42,2	59,1	28,2	n.a	n.a	36,3	28,6	53,3	56,5	80,4
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	32,9	39,5	25,3	n.a	n.a	9,2	26,6	48,4	45,6	22,7
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	48,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Cuanza Norte	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	64,7	79,2	55,5	n.a	n.a	63,1	53,2	73,8	83,3	83,1
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	36,5	55,4	21,5	n.a	n.a	18,9	22,6	47,3	71,1	57,0
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	0,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	96,0	91,2	98,1	97,1	94,9	100,0	95,7	96,1	92,4	82,9
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	37,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,1	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	10,5	13,4	9,2	10,8	10,2	9,8	8,4	14,1	18,0	7,7
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	12,9	24,1	8,1	11,6	14,2	10,4	7,8	17,6	30,5	36,8
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	72,8	94,5	64,8	79,5	66,9	73,5	58,4	94,8	100,0	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	58,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	46,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	2,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	3,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	47,1	87,5	24,5	45,0	49,3	24,8	31,5	64,4	94,5	100,0
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	16,0	30,9	7,6	15,8	16,1	3,9	8,1	20,7	44,6	53,1
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas(%)	21,3	45,9	7,5	21,0	21,6	6,1	5,8	31,3	62,6	89,1
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	21,9	43,7	9,7	22,3	21,5	1,7	17,0	48,7	33,9	10,9
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	100,0	100,0	100,0	na	na	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	29,7	73,4	8,4	n.a	n.a	nf	6,7	73,1	95,6	100,0

Indicadores-Chave		Cuanza Norte	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	92,2	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	42,6	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	39,7	46,8	36,8	41,9	37,5	25,2	40,3	53,3	35,7	70,6
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	83,7	95,0	76,6	84,7	82,5	66,4	84,0	89,5	96,3	98,2
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	17,0	14,4	18,3	15,4	18,8	32,0	10,8	12,1	20,3	5,1
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	16,8	14,0	18,3	16,5	17,1	32,1	11,5	12,3	17,9	4,9
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	9,3	11,5	8,2	10,9	7,6	10,9	7,3	10,6	12,6	7,3
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	13,0	13,9	12,5	15,0	11,0	16,3	11,5	10,4	18,9	5,1
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	38,5	41,4	37,1	42,9	33,9	21,6	45,6	53,7	23,3	34,3
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	23,9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável

n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



CUANZA SUL

INDICADORES CUANZA SUL

Quadro 8 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província do Cuanza Sul

Indicadores-Chave		Cuanza Sul	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000` de pessoas) (*)	2 327 981	958 860	1 369 121	1 133 553	1 194 428	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	19,6	18,6	20,1	19,8	19,4	22,8	20,4	16,4	18,2	14,3
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	37,8	40,1	36,4	40,5	35,4	32,1	36,4	41,5	44,6	37,9
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	20,4	22,5	19,1	n.a	n.a	19,2	19,4	21,2	23,8	21,6
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	34,8	19,6	45,9	n.a	n.a	56,6	50,6	20,5	10,7	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	6,4	2,5	9,1	n.a	n.a	15,5	8,6	3,4	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	6,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	40	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	67	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	22	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	18	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	28	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	18,2	28,3	9,4	15,4	15,2	9,7	9,0	18,4	25,0	57,1
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	49,6	75,4	29,0	n.a	n.a	22,4	27,8	66,1	73,4	92,9
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	81,5	96,6	70,3	n.a	n.a	47,8	74,3	91,0	100,0	100,0

Indicadores-Chave		Cuanza Sul	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	64,3	nd	nd	66,6	62,2	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	27,7	nd	nd	29,0	26,2	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	20,1	13,5	24,2	17,3	22,9	39,0	22,3	15,38	7,829	2,6
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	4,0	4,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	12,4	15,1	10,3	11,5	13,2	8,5	11,7	17,7	11,0	4,3
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	5,4	11,2	1,7	n.a	n.a	1,6	1,1	13,4	2,2	11,3
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,8	3,6	0,5	n.a	n.a	0,0	0,0	2,6	9,5	0,0
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	19,1	33,8	9,5	n.a	n.a	3,1	12,2	21,8	37,1	77,5
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	7,3	15,7	1,2	n.a	n.a	0,0	1,2	6,7	28,0	36,8
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira(%)	67,7	71,3	66,1	n.a	n.a	54,7	72,3	66,2	85,3	64,0
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	43,6	49,6	40,8	45,7	41,7	32,6	45,6	46,1	52,6	43,3
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	51,3	45,9	53,8	n.a	n.a	79,2	45,1	49,7	55,5	50,0
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	10,9	8,2	12,2	11,2	10,7	9,0	14,3	7,3	11,4	2,2
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	51,5	70,9	43,0	n.a	n.a	34,6	47,6	57,6	85,1	100,0
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	16,7	2,5	22,9	n.a	n.a	37,4	17,8	0,9	4,6	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	27,0	64,4	10,9	n.a	n.a	9,2	15,3	45,8	65,4	100,0
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	13,5	21,9	8,0	n.a	n.a	2,0	8,7	15,2	31,9	43,7
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	15,8	27,5	7,3	n.a	n.a	5,4	6,6	23,5	33,9	31,7

Indicadores-Chave		Cuanza Sul	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	44,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	38,5	52,8	30,5	n.a	n.a	23,0	31,4	38,8	71,0	83,7
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	34,0	54,0	20,9	n.a	n.a	15,2	23,1	40,3	60,5	81,9
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	1,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	92,0	93,1	91,5	91,6	92,3	86,7	93,9	94,1	88,4	100,0
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	22,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	1,9	1,2	2,2	0,9	2,8	1,1	2,4	2,7	0,0	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	12,9	11,2	13,6	14,8	11,2	8,9	16,8	11,3	8,1	10,0
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	9,4	12,7	7,9	10,0	8,8	8,8	7,7	10,5	11,4	25,1
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	75,0	98,5	63,8	77,1	72,8	45,0	74,9	93,3	100,0	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	34,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	53,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	1,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	3,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	60,4	89,1	44,1	59,8	60,9	25,5	51,3	81,8	84,0	95,0
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	14,8	27,6	7,5	14,0	15,5	2,6	6,5	18,0	44,4	51,1
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	37,0	57,6	25,2	37,3	36,7	5,2	27,9	45,7	76,7	100,0
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	16,2	26,0	10,6	15,5	16,9	3,0	13,7	29,5	19,8	0,0

Indicadores-Chave		Cuanza Sul	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com (%)privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	95,8	97,4	94,6	na	na	93,4	96,1	97,6	88,8	100,0
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	42,0	73,5	27,2	n.a	n.a	5,0	31,4	64,9	98,2	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	67,5	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	40,0	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	47,4	54,3	44,2	48,5	46,5	31,5	48,0	53,5	55,3	75,8
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	88,0	92,2	85,3	87,8	88,2	68,3	88,5	92,0	96,2	100,0
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	1,6	2,1	1,3	1,8	1,4	2,6	1,8	1,6	0,3	0,0
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	1,8	2,0	1,7	2,0	1,5	2,7	2,1	1,8	0,2	0,1
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	9,0	10,4	8,3	9,6	8,5	12,2	9,2	5,6	11,8	10,4
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	11,3	14,9	9,0	13,1	9,5	14,4	9,3	9,1	17,5	16,4
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	15,3	7,0	19,9	17,9	12,6	15,3	20,3	12,2	7,9	10,0
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	48,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a	Não aplicável
n.d	Não disponível
n.f	Estimativa não fiável
*	Censo 2024, resultados definitivos
¹	Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio
²	As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH
³	Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



MALANJE

INDICADORES MALANJE

Quadro 9 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província de Malanje

Indicadores-Chaves		Malanje	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	1 298 250	729 676	568 574	638 369	659 881	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	18,9	18,8	19,1	18,0	19,9	18,6	15,5	22,2	18,3	19,7
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	39,7	41,4	38,0	40,5	38,9	38,7	39,5	40,5	39,7	41,1
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	20,1	22,7	17,6	n.a	n.a	17,4	17,6	21,6	22,9	24,8
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	16,2	5,8	28,5	n.a	n.a	27,4	18,1	18,3	0,0	4,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	2,3	0,0	5,2	n.a	n.a	5,4	4,4	0,0	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	5,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	20,4	34,4	3,9	15,4	19,2	3,9	0,0	26,7	42,1	54,5
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	62,9	79,5	40,6	n.a	n.a	36,4	53,7	66,0	85,9	91,1
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	79,0	91,4	63,8	n.a	n.a	56,3	69,0	88,2	100,0	100,0
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	56,1	nd	nd	58,5	54	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	30,3	nd	nd	33,3	27,4	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chaves		Malanje	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	30,4	17,8	42,1	29,2	31,5	50,9	32,6	19,3 4	11,32	3,0
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade	2,0	3,0	1,0	2,0	2,0	0,0	1,0	3,0	3,0	5,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	4,6	4,9	4,2	2,9	6,2	4,8	4,1	7,1	3,2	2,4
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	11,3	17,4	2,9	n.a	n.a	3,7	6,5	13,6	18,4	17,0
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	2,2	3,9	0,4	n.a	n.a	0,6	0,0	3,3	4,3	4,5
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	23,9	39,8	2,2	n.a	n.a	0,0	0,0	28,3	38,0	57,6
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	14,8	27,6	1,7	n.a	n.a	0,0	5,1	15,2	31,8	42,1
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	38,7	49,8	31,0	n.a	n.a	28,2	34,9	49,8	51,2	54,0
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	24,2	31,2	19,5	25,4	22,9	16,3	25,8	32,3	31,6	35,2
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	43,6	49,2	38,7	n.a	n.a	23,7	52,9	32,5	74,0	27,0
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	5,1	6,0	4,5	6,6	3,6	3,5	4,4	6,0	8,5	8,9
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	28,8	45,9	17,0	n.a	n.a	17,0	22,3	40,8	54,8	40,7
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	26,0	7,6	38,6	n.a	n.a	42,5	24,5	11,2	2,7	8,5
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	40,4	75,5	16,0	n.a	n.a	13,2	34,0	65,4	76,5	82,0
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	28,0	35,5	17,9	n.a	n.a	20,1	19,4	25,2	46,6	35,7
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	23,2	35,7	10,5	n.a	n.a	11,0	19,5	25,9	37,0	37,9
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	36,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	62,3	74,6	48,9	n.a	n.a	41,2	53,6	71,3	83,5	76,5

Indicadores-Chaves		Malanje	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	38,4	53,7	22,8	n.a	n.a	18,1	31,9	47,5	61,9	57,5
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	1,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	79,9	87,0	75,0	80,5	79,3	70,4	85,0	87,1	94,8	83,2
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	35,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,6	1,6	0,0	0,5	0,7	0,6	0,0	1,9	0,0	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	7,6	8,0	7,3	8,3	6,9	8,2	2,3	7,4	10,2	14,7
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	24,1	25,8	23,0	24,8	23,4	20,8	25,9	26,7	20,7	36,5
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	73,9	87,5	65,7	79,3	68,0	59,8	66,9	89,8	100,0	81,7
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	21,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	44,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	5,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	3,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	61,7	89,6	39,0	61,2	62,0	36,9	44,9	84,8	96,1	96,2
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	18,4	36,0	4,2	18,5	18,3	3,7	4,9	30,1	37,0	50,9
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	28,8	54,3	8,2	29,7	28,0	1,9	16,9	41,6	58,3	87,5
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	19,7	38,5	4,6	19,7	19,8	3,1	15,2	47,3	40,3	12,5
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	93,4	98,6	85,0	na	na	81,7	96,2	97,8	100,0	97,9
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	35,9	79,3	6,0	n.a	n.a	nf	4,9	75,8	97,6	98,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	64,9	na	na	na	na	na	na	na	na	na

Indicadores-Chaves		Malanje	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	37,2	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	28,3	46,4	16,5	27,7	28,9	16,3	20,2	35,4	47,2	79,9
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	65,1	81,5	50,0	68,0	62,4	40,3	60,9	82,2	88,5	93,9
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate à Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	21,5	16,5	25,8	23,1	20,0	21,6	31,1	21,8	11,2	14,3
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	22,2	17,0	27,1	23,8	20,7	23,7	31,4	21,7	10,5	15,7
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	6,7	8,8	5,0	6,4	7,0	7,1	7,5	7,4	3,6	6,1
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	6,8	9,3	4,8	6,0	7,7	6,7	6,7	7,5	4,1	9,3
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	4,5	4,5	4,5	5,3	3,7	4,6	2,5	5,2	7,1	4,4
G09.	Porcentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	23,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável
n.d Não disponível
n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



LUNDA NORTE

INDICADORES LUNDA NORTE

Quadro 10 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província da Lunda Norte

Indicadores-Chave		Lunda Norte	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	1 742 217	1 278 489	463 728	898 545	843 673	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	18,6	19,0	18,1	18,3	19,0	16,7	18,8	19,6	20,3	17,4
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	35,7	35,6	35,8	36,1	35,3	35,7	34,9	36,2	36,1	36,4
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	19,1	20,6	16,4	n.a	n.a	16,2	18,2	20,2	22,3	25,0
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	26,8	24,9	30,7	n.a	n.a	16,5	40,3	30,6	0,0	19,7
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	2,5	1,3	4,3	n.a	n.a	0,0	4,0	3,8	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	6,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	16	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	32	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	16	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	18,1	11,9	22,4	18,6	13,5	20,7	8,7	16,7	16,7	50,0
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	46,7	60,1	19,6	n.a	n.a	13,4	34,3	61,5	85,9	81,1
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	78,5	89,4	64,4	n.a	n.a	59,8	88,6	86,0	100,0	100,0
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	52,7	nd	nd	52,4	52,9	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Lunda Norte	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	20,0	nd	nd	24,8	15,1	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	40,3	36,5	47,4	36,4	44,1	49,4	52,4	33,16	15,05	9,1
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	2,0	4,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	19,5	18,2	22,1	13,5	25,2	23,8	22,4	18,3	11,3	13,5
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,0	1,6	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	1,6	11,9	0,0
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	0,4	0,5	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	7,2	11,2	0,7	n.a	n.a	0,0	3,8	11,8	29,8	27,0
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	18,2	23,0	6,2	n.a	n.a	0,0	8,7	25,4	33,6	55,8
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	34,6	38,0	28,8	n.a	n.a	24,5	40,3	34,1	48,6	25,9
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	27,2	29,5	23,0	26,5	27,8	18,6	31,5	29,3	24,3	14,2
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	33,2	32,3	34,6	n.a	n.a	34,6	33,2	33,1	47,5	0,0
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	11,5	11,6	11,3	11,0	12,0	13,6	10,7	13,6	6,0	5,1
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	36,6	41,5	26,4	n.a	n.a	18,8	33,1	44,5	52,3	42,6
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	30,9	22,0	49,3	n.a	n.a	53,5	37,1	22,9	4,9	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	36,4	44,8	18,9	n.a	n.a	5,7	28,5	48,1	67,9	85,2
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	39,5	42,6	34,4	n.a	n.a	30,9	37,9	48,0	44,5	40,4

Indicadores-Chave		Lunda Norte	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	28,3	33,6	15,1	n.a	n.a	11,8	26,4	42,3	16,3	32,6
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	35,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	33,6	39,9	20,9	n.a	n.a	16,6	34,1	40,7	51,0	35,2
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	43,6	53,6	20,7	n.a	n.a	15,5	34,1	54,3	69,2	85,2
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	4,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	70,6	71,5	68,8	68,4	72,9	61,6	73,2	70,3	76,1	65,7
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	28,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,6	0,5	0,9	0,9	0,4	1,7	0,4	0,5	0,0	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	8,7	8,9	8,5	10,1	7,5	9,1	6,6	12,0	5,7	11,5
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	4,5	6,6	0,6	4,0	5,0	0,3	2,9	7,0	7,8	18,2
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	65,1	78,2	42,3	70,4	60,5	34,9	60,8	80,4	86,5	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	29,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	36,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	9,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	3,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	67,4	76,1	51,0	66,3	68,4	44,0	56,3	85,5	90,9	96,2
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	8,3	11,9	1,6	8,4	8,2	0,8	3,4	9,9	30,2	28,4
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	32,5	46,0	7,1	32,7	32,4	3,8	21,1	47,8	67,1	89,8

Indicadores-Chave		Lunda Norte	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	26,1	36,1	7,4	25,5	26,8	3,1	29,5	40,0	30,6	5,7
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	94,2	96,7	89,1	na	na	85,1	100,0	96,7	89,5	100,0
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	30,2	43,8	6,5	n.a	n.a	0,4	7,9	54,2	86,3	92,1
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	77,5	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	28,7	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	45,4	54,3	29,3	43,7	47,0	26,4	45,3	53,7	55,5	71,1
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	69,4	72,2	64,0	71,0	67,7	56,4	65,1	74,3	84,9	98,4
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	14,1	13,5	15,1	13,5	14,7	13,3	24,1	8,1	4,2	0,0
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	14,3	13,4	15,9	13,5	15,1	14,1	25,2	7,7	3,7	0,4
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	8,9	9,5	8,0	9,0	8,9	9,6	7,3	9,6	11,8	7,7
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	10,5	11,5	8,6	11,6	9,3	7,7	9,4	11,8	16,1	8,4
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	14,5	3,6	34,5	9,3	19,9	35,0	17,5	5,7	3,6	6,9
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	25,9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável

n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).

INDICADORES BENGUELA

Quadro 11 - IndicadoresChave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província de Benguela

Indicadores-Chave		Benguela	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000` de pessoas) (*)	2 597 638	1 545 159	1 052 479	1 246 173	1 351 465	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	18,1	16,8	19,8	18,5	17,8	20,7	18,1	13,8	14,9	22,7
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	39,5	40,0	38,8	41,0	38,2	37,2	40,3	41,3	41,8	37,8
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	22,1	23,3	19,8	n.a	n.a	19,6	19,7	20,3	24,6	26,4
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	9,9	5,3	24,1	n.a	n.a	26,3	18,7	13,7	2,0	2,5
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	3,1	1,2	7,8	n.a	n.a	13,8	0,0	4,7	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	5,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	55	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	86	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	30	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	25	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	33	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	20,1	11,6	5,0	5,4	12,5	4,8	4,3	8,8	12,0	18,2
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	83,7	91,1	57,0	n.a	n.a	39,1	76,1	92,0	90,5	98,1
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	80,6	91,1	58,5	n.a	n.a	45,9	79,4	86,5	85,9	100,0
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	69,4	nd	nd	68,0	70,5	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	44,9	nd	nd	45,3	44,4	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	21,9	14,4	40,0	21,4	22,3	50,2	32,1	19,77	9,659	6,5

Indicadores-Chave		Benguela	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	3,0	3,0	1,0	3,0	3,0	0,0	1,0	3,0	4,0	5,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	9,2	12,3	2,6	8,4	10,0	1,6	6,7	14,8	11,1	11,2
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	0,5	0,6	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	7,0	9,4	0,7	n.a	n.a	0,0	0,0	8,7	10,8	10,3
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	33,1	43,7	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	9,0	45,7	69,6
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	16,5	20,7	5,0	n.a	n.a	0,0	,0	11,5	14,3	40,6
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	49,6	59,4	29,2	n.a	n.a	22,7	45,4	60,4	61,6	62,7
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	31,5	38,7	19,4	30,7	32,2	17,5	29,9	29,1	44,6	42,4
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	23,8	28,8	12,7	n.a	n.a	13,7	24,5	21,4	52,5	8,4
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	14,7	14,5	15,2	14,3	15,2	15,1	19,9	13,1	12,0	13,5
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	56,2	69,8	40,5	n.a	n.a	37,8	46,5	67,6	75,2	76,5
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	12,9	6,5	20,3	n.a	n.a	23,2	13,8	11,5	4,5	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	48,8	69,0	25,2	n.a	n.a	21,2	37,9	55,0	73,5	92,5
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	28,6	34,7	9,5	n.a	n.a	9,3	8,7	19,6	35,4	47,7
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	16,3	19,5	7,4	n.a	n.a	2,0	8,0	22,3	15,1	25,7
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	49,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	48,7	62,5	6,8	n.a	n.a	3,5	15,5	43,0	71,6	76,3
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	38,6	48,2	12,4	n.a	n.a	3,1	18,5	35,0	51,1	64,3
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade(%)	1,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Benguela	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	91,7	91,7	91,6	91,2	92,1	90,4	93,2	92,6	100,0	81,7
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	12,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,5	0,9	0,0	0,0	1,1	0,0	0,9	0,7	0,7	0,6
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	20,5	22,4	17,4	19,0	22,0	15,4	18,8	19,2	27,0	24,8
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	25,8	36,6	9,0	25,7	25,9	7,7	27,3	28,5	34,2	41,4
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	77,6	90,4	62,6	79,7	75,9	63,0	79,2	77,3	87,4	93,1
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	30,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	44,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	3,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	2,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	80,4	95,6	45,2	80,8	80,0	30,5	69,3	94,4	99,4	100,0
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	20,8	28,3	3,3	19,7	21,7	0,5	6,0	18,8	23,8	48,8
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	40,9	56,6	4,6	42,4	39,6	0,1	9,3	35,4	60,7	86,3
D05.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	22,7	29,7	6,4	21,4	23,8	0,9	18,3	41,4	36,4	13,3
D06.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	97,4	98,4	94,2	na	na	87,7	95,5	100,0	100,0	97,8
D07.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	46,8	67,5	4,0	n.a	n.a	nf	2,9	44,7	97,1	99,4
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	95,7	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	52,7	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	33,6	45,5	13,2	33,2	33,9	11,6	18,4	27,2	54,7	68,2
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	75,2	87,6	45,3	76,1	74,4	37,0	55,4	77,3	97,3	95,5

Indicadores-Chave		Benguela	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	4,9	2,4	10,5	6,1	3,8	6,3	16,9	2,2	0,9	0,1
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	5,1	2,8	10,4	6,3	4,0	5,9	17,8	3,1	1,1	0,1
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	10,3	10,2	10,5	10,3	10,3	9,8	14,4	4,8	13,2	9,7
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	11,6	12,3	10,2	11,5	11,8	13,0	12,3	9,5	15,7	7,3
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar(%)	3,5	1,9	9,4	3,5	3,6	9,4	6,5	3,8	1,0	1,1
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	6,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

- n.a Não aplicável
- n.d Não disponível
- n.f Estimativa não fiável
- * Censo 2024, resultados definitivos
- ¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio
- ² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH
- ³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



HUAMBO

INDICADORES HUAMBO

Quadro 12 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província do Huambo

Indicadores-Chaves		Huambo	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	2 691 902	1 297 752	1 394 150	1 296 018	1 395 883	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	16,8	16,4	17,0	18,3	15,2	16,3	15,6	16,8	18,7	22,4
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	40,5	42,8	38,4	42,1	39,1	40,0	38,5	42,8	43,3	40,9
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	20,7	22,3	19,3	n.a	n.a	19,4	19,6	20,3	23,3	25,2
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	10,1	0,9	21,5	n.a	n.a	17,0	21,5	0,0	0,0	3,2
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	0,0	0,0	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	5,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	46	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	85	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	15	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	31	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	41	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	20,2	32,4	8,3	15,9	23,7	10,5	11,1	25,8	40,0	66,7
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	65,3	90,7	31,5	n.a	n.a	14,8	40,7	93,8	97,3	100,0
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	68,4	82,3	55,7	n.a	n.a	55,9	55,1	73,1	90,9	85,3
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	68,1	nd	nd	66,4	70	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	35,6	nd	nd	35,5	35,6	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chaves		Huambo	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	26,5	12,5	41,3	26,9	26,2	44,3	36,8	16,52	5,019	10,6
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	2,0	4,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	3,0	5,0	5,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	8,1	9,5	6,6	7,2	8,9	6,4	6,0	10,5	12,0	7,3
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,8	2,7	0,9	n.a	n.a	0,0	1,4	4,7	2,0	1,6
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	4,8	8,9	0,0	n.a	n.a	1,0	0,5	4,3	8,0	19,8
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	23,6	45,2	2,0	n.a	n.a	3,3	2,4	19,0	48,2	73,0
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	16,7	30,5	1,0	n.a	n.a	0,0	1,1	26,4	34,3	47,6
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	30,5	45,7	19,0	n.a	n.a	13,0	22,2	48,2	48,6	71,5
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	20,8	35,1	11,2	21,7	19,8	7,7	14,5	35,7	38,0	31,9
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	23,2	28,2	20,0	n.a	n.a	7,1	26,3	29,4	27,8	63,5
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	5,6	5,5	5,6	6,8	4,2	6,4	6,4	4,7	3,7	2,5
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	51,7	65,9	43,8	n.a	n.a	46,5	40,0	64,9	76,4	77,3
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	15,1	5,5	20,5	n.a	n.a	24,1	17,8	9,2	0,0	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	33,3	63,3	16,5	n.a	n.a	9,5	22,9	51,6	76,5	84,1
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	28,8	44,9	12,8	n.a	n.a	12,0	14,6	27,6	49,6	57,5
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	18,5	32,1	3,1	n.a	n.a	0,0	6,6	21,6	40,6	45,3

Indicadores-Chaves		Huambo	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	31,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	42,7	62,1	24,5	n.a	n.a	19,4	31,0	50,5	57,1	81,3
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	29,1	50,4	6,7	n.a	n.a	8,5	9,4	39,9	58,3	67,4
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	0,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	89,0	92,8	86,9	88,5	89,5	86,6	87,2	92,8	94,0	92,0
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade(%)	19,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	1,1	1,2	1,1	1,5	0,8	1,2	1,0	1,0	2,4	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	7,7	8,5	7,2	7,8	7,5	8,3	6,6	7,5	10,6	6,9
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	20,4	33,3	12,9	18,5	22,4	9,7	18,6	26,7	34,3	34,8
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	60,9	91,0	40,8	59,4	62,7	28,6	50,5	74,7	96,4	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	27,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	47,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	4,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	2,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	46,9	77,4	18,9	45,8	47,9	10,0	27,2	69,0	89,9	97,7
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	14,0	23,2	5,5	13,6	14,3	4,3	6,5	16,2	28,4	38,5
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	54,2	60,2	48,8	55,2	53,4	25,2	58,8	56,6	60,8	95,5
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	31,2	37,4	25,4	30,7	31,6	27,5	31,0	41,4	39,2	4,5
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	96,4	98,0	93,3	na	na	100,0	87,9	100,0	97,6	100,0

Indicadores-Chaves		Huambo	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	31,1	70,6	1,3	n.a	n.a	nf	2,1	68,8	98,2	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	83,8	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	33,9	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	25,3	39,6	15,7	25,2	25,4	11,2	17,5	36,1	43,5	63,8
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	63,6	86,9	39,1	63,2	64,1	35,2	46,5	80,7	94,7	95,5
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	15,1	12,4	17,8	13,7	16,5	19,9	19,2	7,7	7,1	21,5
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	15,1	12,5	18,0	14,1	16,2	20,7	19,1	7,9	7,9	19,4
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	9,1	12,9	5,8	9,5	8,8	10,2	5,7	9,1	15,2	9,1
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	10,1	12,9	7,2	11,4	8,9	13,4	5,5	8,0	17,4	8,9
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	0,8	0,8	0,8	0,2	1,4	0,8	0,7	0,9	1,3	0,0
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	28,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável

n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).

INDICADORES BIÉ

Quadro 13 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança - Província do Bié

Indicadores-Chave		Bié	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000` de pessoas) (*)	2 264 874	1 011 171	1 253 703	1 090 904	1 173 970	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	19,7	18,0	20,7	21,9	17,6	17,6	24,6	12,5	24,5	25,0
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	41,6	45,2	39,0	43,3	40,1	38,8	39,1	48,2	46,4	42,0
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	21,3	21,9	20,8	n.a	n.a	20,2	22,0	21,4	20,5	24,9
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	16,5	8,1	21,7	n.a	n.a	24,6	21,2	5,7	5,4	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	2,1	0,0	4,0	n.a	n.a	1,4	6,6	0,0	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	5,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	23	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	53	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	14	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	32	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	9,7	15,7	5,8	10,3	10,3	0,0	17,1	16,7	16,7	20,0
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	40,7	83,2	16,7	n.a	n.a	6,1	36,3	72,5	95,3	85,8
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	63,3	86,6	40,2	n.a	n.a	42,9	51,5	67,1	94,0	100,0
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	44,3	nd	nd	47,5	41,0	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	27,2	nd	nd	32,3	22,2	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	41,3	20,5	54,4	38,9	43,7	70,8	28,7	22,84	14,01	15,2
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	3,0	4,0	5,0

Indicadores-Chave		Bié	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	3,0	4,0	5,0
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	0,4	0,7	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,3	3,2	0,0	n.a	n.a	0,0	1,2	2,8	0,0	4,8
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	14,6	20,6	8,3	n.a	n.a	0,0	6,3	18,3	34,6	30,7
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	6,9	15,0	1,3	n.a	n.a	0,0	,0	7,9	25,7	47,4
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	24,6	35,9	19,1	n.a	n.a	13,9	23,0	49,7	39,3	42,0
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	14,4	20,2	11,9	15,0	13,7	9,4	16,3	20,9	25,9	17,3
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	13,2	27,1	7,5	n.a	n.a	5,4	20,0	17,6	48,3	0,0
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	8,3	11,9	6,9	7,4	9,0	5,9	8,9	12,8	13,6	14,7
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	37,3	73,8	22,5	n.a	n.a	17,1	34,5	76,7	96,9	85,9
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	43,8	12,9	56,4	n.a	n.a	60,4	43,6	9,2	11,5	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	20,9	53,1	8,2	n.a	n.a	6,0	16,9	41,4	82,2	85,9
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	12,0	20,0	3,7	n.a	n.a	0,0	4,1	20,8	18,4	32,8
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	23,8	49,5	6,4	n.a	n.a	3,0	14,7	51,7	54,7	54,0
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	23,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	44,4	67,5	28,2	n.a	n.a	18,8	33,2	65,5	68,3	83,5
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	25,6	54,3	7,2	n.a	n.a	3,8	16,6	50,0	68,0	68,5
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	1,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	97,4	95,2	98,3	98,4	96,4	97,3	99,1	97,4	94,7	83,1
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	36,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Bié	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	11,9	18,7	9,2	12,8	11,1	7,5	15,8	13,0	24,9	16,1
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	24,4	34,1	20,5	22,6	25,9	21,8	24,4	28,8	34,6	29,8
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	56,9	82,9	46,9	53,4	61,8	54,5	43,2	81,1	100,0	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	45,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	56,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	3,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	4,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	46,9	77,6	30,0	47,3	46,5	18,4	50,2	75,5	89,3	91,2
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	12,4	25,0	5,4	12,9	11,8	2,2	9,9	22,0	30,7	41,6
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	18,7	32,9	10,9	19,1	18,3	4,0	14,7	20,4	58,4	80,2
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	16,3	24,9	11,6	16,8	15,9	8,5	17,7	29,6	27,6	10,2
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	81,4	98,4	69,6	na	na	67,6	74,3	95,3	100,0	100,0
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	22,7	54,0	7,4	n.a	n.a	nf	4,8	73,4	95,4	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	75,4	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar(%)	26,1	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	15,9	28,5	10,6	14,3	17,4	8,0	13,2	27,4	49,5	48,1
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	46,6	75,4	28,4	47,8	45,4	16,5	40,4	76,4	88,6	90,4
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate à Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	9,4	4,9	12,2	8,1	10,7	8,3	5,9	20,6	0,0	6,4
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	9,9	4,9	13,1	8,6	11,2	8,7	6,0	21,7	0,0	6,9
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	13,2	12,4	13,7	13,0	13,4	15,3	9,4	17,5	7,3	9,8

Indicadores-Chave		Bié	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	8,7	11,7	6,6	8,7	8,7	6,7	8,8	13,8	6,0	7,0
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	3,5	2,3	5,0	4,8	2,3	5,2	1,2	4,6	1,6	7,3
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	6,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

- n.a Não aplicável
- n.d Não disponível
- n.f Estimativa não fiável
- * Censo 2024, resultados definitivos
- ¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio
- ² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH
- ³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



MOXICO

INDICADORES MOXICO

Quadro 14 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança Província do Moxico

Indicadores-Chave		Moxico	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	985 327	616 120	369 207	481 770	503 557	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A03.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	20,8	21,1	20,4	18,7	23,2	19,7	20,7	21,1	22,6	26,1
A04.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	39,7	40,4	39,1	39,2	40,2	39,3	38,6	42,8	38,9	38,6
A05.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	20,7	22,5	18,8	n.a	n.a	18,1	19,9	23,5	21,5	27,4
A06.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	22,7	14,2	31,3	n.a	n.a	34,4	18,8	23,5	32,8	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	7,1	1,8	12,4	n.a	n.a	11,2	10,3	4,5	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	6,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	17	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	29	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	12	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	12,8	23,1	1,3	8,1	13,9	1,6	9,7	21,9	10,0	57,1
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	43,6	75,8	11,1	n.a	n.a	10,0	25,8	71,8	100,0	100,0
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	74,9	88,3	62,8	n.a	n.a	64,8	52,1	89,1	100,0	100,0
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	50,4	nd	nd	49,1	51,8	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	27,7	nd	nd	29,2	26,5	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Moxico	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	41,6	18,3	63,6	40,3	42,8	68,5	43,6	15,06	16,56	6,4
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	3,0	4,0	6,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	15,5	11,5	20,3	16,3	14,7	19,4	23,6	10,2	3,1	2,9
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	4,2	7,9	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	12,7	5,1	10,4
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,0	1,9	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,8	13,2	0,0
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	31,2	55,5	4,4	n.a	n.a	6,0	8,4	65,7	95,5	49,9
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	7,9	14,3	0,4	n.a	n.a	0,0	,6	7,6	36,0	28,2
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	16,6	26,2	9,4	n.a	n.a	5,2	18,2	25,6	41,7	31,6
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	5,4	9,0	2,7	6,6	4,2	1,8	5,9	10,3	10,6	6,9
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	2,2	6,0	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	6,3	6,9	5,8	7,4	5,3	4,5	5,6	12,3	2,3	7,5
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	30,1	45,6	16,8	n.a	n.a	15,1	23,3	59,9	50,4	50,8
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	51,7	28,3	71,8	n.a	n.a	78,1	51,3	19,8	22,0	12,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	33,1	52,1	16,4	n.a	n.a	12,3	22,5	64,1	72,8	90,0
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	10,7	18,3	2,3	n.a	n.a	3,1	4,3	16,5	36,9	18,3
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	14,7	22,6	5,6	n.a	n.a	7,5	8,0	19,7	40,9	25,4

Indicadores-Chave		Moxico	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	17,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	26,4	39,9	9,7	n.a	n.a	11,4	17,4	35,9	46,5	48,0
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	30,2	50,9	8,3	n.a	n.a	9,2	17,9	45,6	60,2	72,6
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	2,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	79,1	85,0	73,9	80,5	77,6	70,3	75,4	93,0	97,2	91,6
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	27,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	5,1	7,4	3,0	7,4	2,9	3,4	2,3	8,1	13,2	12,8
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	9,2	17,2	2,0	10,5	8,0	1,9	4,5	19,4	26,8	30,3
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	31,9	48,0	19,2	26,2	37,9	12,1	26,9	58,8	55,5	63,9
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	22,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	34,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	11,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	4,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	48,4	82,5	18,1	47,3	49,4	16,1	39,9	85,5	95,4	95,5
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	8,4	16,9	0,8	8,4	8,4	1,4	5,3	14,2	15,9	31,0
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	31,5	54,3	11,4	31,2	31,9	4,2	32,4	41,6	72,1	91,0
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	14,2	23,0	6,3	14,8	13,5	4,6	14,3	33,1	21,9	5,2
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	79,2	90,6	65,2	na	na	68,9	74,7	97,1	100,0	73,6

Indicadores-Chave		Moxico	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade(%)	27,9	60,7	3,1	n.a	n.a	1,1	6,1	79,6	100,0	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	51,2	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	22,6	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	47,2	56,1	40,0	46,8	47,5	35,6	52,2	48,7	73,5	65,8
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	78,9	90,9	67,5	78,2	79,5	61,4	79,4	94,4	95,3	98,8
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	10,1	9,5	10,7	11,5	8,8	12,2	10,3	3,3	11,0	18,5
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	11,2	10,4	11,9	12,3	10,2	13,7	10,8	3,6	14,8	18,6
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	9,5	10,8	8,4	9,8	9,3	8,3	11,1	9,8	8,6	9,7
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	10,0	15,8	4,1	8,0	12,0	3,7	9,2	15,5	17,6	16,9
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	4,0	5,0	2,1	3,1	4,8	2,4	0,8	4,3	13,7	7,3
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	19,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável

n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



CUANDO CUBANGO

INDICADORES CUANDO CUBANGO

Quadro 15 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança Província do Cuando Cubango

Indicadores-Chave		C.Cubango	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000` de pessoas) (*)	709 217	443 357	265 860	349 452	359 765	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	21,4	21,8	21,0	20,6	22,2	21,4	22,0	20,1	22,2	23,7
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	37,9	37,9	37,7	40,4	35,5	35,9	36,7	37,1	43,2	40,8
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	20,3	22,0	18,2	n.a	n.a	18,9	17,8	20,9	21,3	27,8
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	21,9	10,8	37,3	n.a	n.a	39,2	21,9	23,1	3,9	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto(%)	5,8	0,0	12,6	n.a	n.a	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	6,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	51	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	87	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	32	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	20	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	38	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	15,8	16,9	13,7	12,1	19,6	15,6	12,9	11,8	33,3	10,0
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	65,5	80,9	45,3	n.a	n.a	43,8	58,7	69,8	86,0	94,9
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	87,5	95,2	77,6	n.a	n.a	68,5	82,0	96,5	93,9	100,0
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	58,4	nd	nd	58,2	58,6	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	28,1	nd	nd	28,2	28,1	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	31,6	24,1	40,7	31,5	31,7	47,0	32,5	29,24	15,52	3,6
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	2,0	3,0	5,0

Indicadores-Chave		C. Cubango	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	13,5	13,1	14,1	10,8	15,9	15,0	18,8	14,2	7,8	6,7
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,7	2,9	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	2,7	4,0	0,0
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	6,3	8,8	2,7	n.a	n.a	0,0	6,4	10,5	8,7	11,6
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	23,3	36,9	3,7	n.a	n.a	0,0	24,3	27,9	33,4	69,4
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	9,7	16,5	0,0	n.a	n.a	0,0	1,5	13,0	18,3	36,5
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	26,3	35,2	17,0	n.a	n.a	12,9	22,6	39,1	35,1	61,4
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	13,9	18,2	9,4	12,0	15,8	6,6	15,5	21,7	14,4	25,1
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	16,2	17,8	14,7	n.a	n.a	19,5	0,0	21,0	23,0	0,0
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	23,0	17,9	28,0	26,1	19,9	23,2	32,1	16,1	17,8	28,4
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	53,9	60,3	47,0	n.a	n.a	38,3	61,4	54,1	79,6	64,9
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	30,4	20,5	41,0	n.a	n.a	49,2	22,1	24,6	10,6	14,2
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	23,4	32,9	13,7	n.a	n.a	10,5	18,4	34,0	29,9	76,3
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	12,4	18,5	3,6	n.a	n.a	2,9	12,1	14,2	17,6	29,9
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	10,6	10,8	10,4	n.a	n.a	12,7	10,0	7,5	13,8	8,5
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado(%)	46,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	28,0	36,6	15,8	n.a	n.a	11,6	22,7	28,7	40,6	66,3

Indicadores-Chave		C. Cubango	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	23,4	32,8	10,3	n.a	n.a	4,9	16,3	32,0	42,9	40,6
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	2,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	79,3	73,2	85,7	81,7	77,5	85,4	78,6	68,5	85,0	80,7
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	7,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	2,9	1,1	4,7	5,5	0,4	4,7	5,1	0,0	0,0	1,5
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	23,2	17,5	28,8	25,7	20,6	28,4	19,4	22,8	13,1	26,8
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	18,3	15,7	21,0	17,4	19,2	20,4	24,4	10,8	12,2	28,6
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	66,5	92,9	37,1	67,2	66,1	41,0	47,2	89,2	100,0	88,1
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	11,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	37,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	3,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	3,9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	53,6	87,2	13,0	53,3	54,0	12,4	50,5	76,7	96,0	96,9
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	19,0	30,0	5,6	18,2	19,9	2,6	7,3	25,5	47,0	54,1
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	24,7	39,3	7,0	26,0	23,4	6,0	6,8	27,3	60,5	89,7
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	26,4	42,7	6,6	25,0	27,7	2,7	29,0	53,3	39,3	7,5
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	92,1	88,4	97,7	na	na	96,7	96,7	84,1	95,1	85,2
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	35,6	62,5	7,4	n.a	n.a	0,6	17,7	66,3	93,0	98,3
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	43,6	na	na	na	na	na	na	na	na	na

Indicadores-Chave		C. Cubango	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar	39,4	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	40,1	49,0	31,1	38,4	41,8	27,2	37,9	44,4	63,8	77,4
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	79,5	88,4	68,5	79,8	79,2	61,5	78,4	89,7	92,1	99,0
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	8,9	11,0	6,0	8,4	9,4	9,4	7,5	5,0	15,8	4,8
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	8,8	10,6	6,5	8,5	9,2	9,3	8,2	5,1	14,6	5,0
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	8,6	7,0	10,4	8,7	8,4	9,7	8,4	6,8	9,0	8,8
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	9,1	7,3	11,3	8,6	9,7	11,1	10,1	6,7	8,1	9,9
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	13,2	11,8	15,1	14,2	12,2	15,6	17,3	7,4	10,8	22,6
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	27,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável

n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



NAMIBE

INDICADORES NAMIBE

Quadro 16 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança Província do Namibe

Indicadores-Chave		Namibe	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	815 708	539 189	276 519	399 859	415 849	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	16,6	17,5	15,6	17,1	16,0	15,6	10,4	14,1	20,4	21,7
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	37,1	38,6	34,6	38,7	35,5	35,2	31,1	39,0	43,3	34,8
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	24,7	26,3	21,8	n.a	n.a	21,0	24,2	25,4	25,9	27,8
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	4,0	4,5	2,4	n.a	n.a	3,5	0,0	5,6	6,8	1,3
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	1,0	1,3	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	4,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	16	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	22	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	19,9	18,8	10,1	15,1	14,8	11,1	0,0	13,3	26,9	19,2
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	82,0	96,1	41,6	n.a	n.a	19,9	65,9	93,8	96,2	100,0
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	93,5	98,5	71,0	n.a	n.a	57,5	73,0	100,0	100,0	100,0

Indicadores-Chave		Namibe	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	68,3	nd	nd	66,5	70,2	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	47,2	nd	nd	44,0	50,3	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	26,2	13,4	56,5	27,2	25,1	63,8	43,3	19,56	10,64	4,9
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	3,0	4,0	0,0	2,0	3,0	0,0	1,0	3,0	4,0	5,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	12,7	12,0	14,5	9,2	15,5	14,8	14,6	16,9	11,7	8,7
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	5,1	6,6	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	9,8	8,0
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	2,2	3,1	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	1,8	4,0	3,1
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	63,9	73,4	32,8	n.a	n.a	5,0	51,4	67,7	72,6	83,4
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	24,0	30,8	5,4	n.a	n.a	1,8	4,9	19,7	31,6	40,4
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	20,1	27,1	7,7	n.a	n.a	3,0	14,1	21,2	33,2	31,9
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	10,0	14,9	3,8	8,5	12,0	1,8	8,4	9,0	18,5	21,3
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	6,9	9,5	0,0	n.a	n.a	0,0	11,0	0,0	8,8	20,7
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	4,0	2,8	5,6	4,3	3,6	6,6	1,5	4,6	3,4	0,0
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	41,8	60,8	19,7	n.a	n.a	8,8	38,4	66,7	46,5	84,3
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	37,3	8,0	71,6	n.a	n.a	80,9	48,3	5,1	8,8	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	52,0	78,7	22,5	n.a	n.a	10,5	39,3	78,4	85,2	92,1
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	32,0	37,6	13,8	n.a	n.a	0,0	15,5	51,9	30,5	40,1
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	26,4	34,6	4,2	n.a	n.a	0,0	7,4	24,0	25,4	51,2
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	46,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Namibe	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	41,6	52,3	15,8	n.a	n.a	5,9	20,9	50,0	50,3	61,9
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	44,7	60,8	6,7	n.a	n.a	1,0	19,9	48,6	57,1	74,4
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	1,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	91,1	93,6	88,3	90,6	91,7	86,2	92,5	97,4	96,9	88,4
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	2,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,2	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	7,7	8,2	7,0	8,6	6,8	6,0	3,3	12,8	10,9	3,9
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	11,5	17,3	3,7	13,8	8,8	1,8	4,3	10,9	21,4	26,4
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	60,1	87,5	25,6	61,2	58,9	17,2	48,3	88,0	81,6	95,9
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	43,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	44,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	5,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	3,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	81,4	98,9	47,1	80,8	82,0	36,3	96,1	96,1	99,2	99,7
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	24,5	34,0	5,8	24,6	24,3	0,7	15,0	18,1	32,4	53,3
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	32,4	47,4	3,1	31,5	33,3	1,8	3,5	20,7	40,8	80,0
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	22,7	33,1	2,2	22,1	23,2	0,0	3,4	40,1	44,5	20,0
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	85,6	91,6	64,2	na	na	62,6	63,1	83,6	90,2	95,9
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	56,7	83,0	10,1	n.a	n.a	nf	7,5	69,5	99,3	99,8
D08.	Porcentagem da população que lavou as mãos (%)	92,2	na	na	na	na	na	na	na	na	na

Indicadores-Chave		Namibe	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	59,8	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	39,0	54,2	19,5	38,7	39,3	14,8	44,7	37,9	58,5	67,4
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	78,4	93,6	42,6	78,6	78,2	33,6	71,0	90,1	96,9	96,6
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	14,2	14,5	13,6	15,0	13,3	12,6	5,9	15,2	15,4	16,4
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	15,3	14,9	16,3	16,5	14,1	15,0	10,7	16,0	15,6	16,0
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	8,1	9,1	6,4	8,5	7,8	6,2	5,5	7,6	13,9	6,1
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	9,2	12,0	2,0	9,3	9,1	1,3	2,0	7,3	19,3	8,9
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	13,8	8,0	32,2	13,6	13,9	39,7	7,7	3,7	7,7	12,1
G09.	Porcentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	10,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável

n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



INDICADORES HUÍLA

Quadro 17 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança Província da Huíla

Indicadores-Chave		Huila	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	3 302 866	1 287 615	2 015 250	1 599 066	1 703 799	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A03.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	16,9	16,7	17,1	15,2	18,5	18,0	15,8	20,0	11,8	13,0
A04.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	38,1	37,0	38,8	38,5	37,9	38,8	35,9	38,5	40,2	36,4
A05.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	20,0	23,6	17,9	n.a	n.a	17,3	20,7	20,1	26,6	23,8
A06.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	10,8	5,2	15,9	n.a	n.a	10,8	19,8	20,4	1,3	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	1,4	2,3	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	5,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	17	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	27	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	15	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	10	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	14,4	15,0	14,4	13,6	15,6	9,4	17,2	14,3	25,0	37,5
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	67,3	95,3	41,6	n.a	n.a	27,9	68,1	92,5	98,9	100,0
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	81,3	96,7	57,8	n.a	n.a	47,5	82,3	91,6	100,0	100,0

Indicadores-Chave		Huila	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	60,5	nd	nd	60,3	60,6	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	26,6	nd	nd	27,3	25,9	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	32,2	13,4	43,3	31,5	32,7	52,7	28,3	11,8	6,4	7,8
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	3,0	5,0	4,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	6,8	11,4	2,8	5,6	7,9	3,3	4,5	13,2	7,3	10,5
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	2,3	4,2	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	2,8	4,3	6,1
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	1,9	4,0	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	4,3	6,2	0,0
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	41,3	68,9	6,9	n.a	n.a	0,0	17,9	69,9	82,2	47,5
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	12,7	24,2	2,3	n.a	n.a	1,1	6,5	17,6	24,2	50,8
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	16,4	27,6	9,6	n.a	n.a	3,9	20,1	22,4	38,1	41,2
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	7,6	10,5	6,0	8,0	7,2	1,8	12,6	7,1	15,6	23,6
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	10,6	7,1	15,5	n.a	n.a	0,0	20,0	4,1	10,6	100,0
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	4,0	9,0	1,0	3,6	4,5	1,0	3,8	10,5	4,3	5,9
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	8,9	25,3	0,0	n.a	n.a	0,0	3,1	26,4	16,7	42,0
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	62,0	22,3	83,6	n.a	n.a	94,3	64,8	20,6	6,9	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	23,5	58,5	4,1	n.a	n.a	0,9	8,7	50,5	85,6	100,0
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	20,7	32,5	5,9	n.a	n.a	0,0	0,0	34,1	47,9	25,6
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	13,9	21,4	7,1	n.a	n.a	4,3	9,4	21,0	20,9	41,9

Indicadores-Chave		Hufla	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	25,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	34,6	56,8	13,6	n.a	n.a	6,6	20,5	50,4	51,7	82,8
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	47,8	77,1	22,5	n.a	n.a	15,0	38,6	77,1	82,5	86,5
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	0,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	94,9	97,0	93,8	91,2	97,9	92,6	98,1	96,4	97,1	91,0
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	11,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,6	1,3	0,2	0,6	0,6	0,3	1,3	0,0	1,8	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	10,2	13,3	8,3	12,0	8,5	8,5	10,3	15,3	11,2	0,0
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	25,9	23,0	27,7	26,6	25,3	24,6	29,1	23,0	27,2	32,1
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	41,7	81,2	19,2	29,1	52,1	10,5	42,2	83,8	83,9	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	40,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	C26.
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	47,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	4,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	2,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	64,8	85,3	52,0	66,3	63,5	52,2	56,4	77,0	89,7	98,4
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	14,2	29,4	4,7	13,9	14,5	2,1	10,7	24,1	36,8	38,7
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	24,1	43,6	12,0	24,5	23,8	2,6	26,6	30,0	48,7	95,1
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	20,2	44,1	5,4	19,0	21,3	0,6	20,5	55,2	50,4	4,9
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	94,2	94,1	94,4	na	na	94,6	88,2	93,4	97,5	100,0
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	33,0	74,7	7,8	n.a	n.a	1,7	13,1	79,1	99,5	100,0

Indicadores-Chave		Hufla	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	93,7	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	32,7	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	26,6	46,9	15,3	27,5	25,8	11,5	23,4	35,2	65,0	82,8
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	58,2	86,8	41,3	56,8	59,5	30,4	57,5	89,0	96,1	95,2
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	3,2	2,8	3,4	3,4	3,0	3,4	3,3	0,9	5,9	2,3
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	3,5	3,6	3,4	4,0	3,0	3,7	3,0	0,8	6,5	5,4
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	8,8	11,6	7,2	9,2	8,4	8,8	6,7	10,0	8,4	13,8
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	7,9	13,9	5,0	9,2	6,9	4,6	6,5	15,9	8,6	18,9
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	5,3	6,5	4,5	4,7	5,8	6,2	2,0	6,6	8,3	1,1
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	62,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável
n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



INDICADORES CUNENE

Quadro 18 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança Província do Cunene

Indicadores-Chave		Cunene	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	1 806 417	460 653	1 345 764	867 639	938 777	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	15,9	18,1	15,5	16,9	14,9	15,3	12,9	16,7	22,2	20,7
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	41,3	38,9	42,0	44,6	38,5	42,3	39,6	40,2	42,2	36,2
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	19,6	27,5	17,3	n.a	n.a	16,8	19,2	23,9	26,0	31,0
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	1,9	0,0	3,5	n.a	n.a	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	0,0	0,0	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	6,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	47	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	77	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	25	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	22	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	31	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	14,1	20,0	4,8	3,5	11,1	4,3	14,3	0,0	33,3	20,0
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	61,5	94,3	34,1	n.a	n.a	23,4	84,8	93,4	98,5	94,4
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	51,2	85,1	34,8	n.a	n.a	22,4	77,9	43,8	83,1	100,0
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	48,1	nd	nd	48,6	47,6	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Cunene	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	29,7	nd	nd	25,9	33,0	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	38,4	8,2	53,3	40,3	36,6	56,6	29,6	7,08	5,858	8,5
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	3,0	4,0	4,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	17,9	8,3	22,4	14,8	20,3	25,4	8,6	5,9	6,7	9,9
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f	n.f
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	0,5	1,1	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	26,0	55,6	6,3	n.a	n.a	1,3	24,3	31,1	59,8	56,5
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	33,3	66,1	5,6	n.a	n.a	2,7	25,6	40,7	65,0	78,6
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	35,5	63,7	19,3	n.a	n.a	18,5	36,4	49,0	71,4	73,0
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	12,3	24,4	7,7	14,4	9,9	8,6	12,8	18,2	21,2	25,7
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	15,0	29,1	6,6	n.a	n.a	6,8	0,0	0,0	56,4	22,7
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	24,5	20,4	26,3	27,2	21,6	27,8	21,4	22,8	12,7	19,8
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	36,4	60,0	25,5	n.a	n.a	24,4	49,6	51,3	44,1	77,0
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	7,4	1,4	10,1	n.a	n.a	11,5	1,3	0,0	0,0	3,6
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	53,2	78,9	41,4	n.a	n.a	39,8	61,4	77,8	68,4	93,1
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	10,4	22,1	2,6	n.a	n.a	3,6	14,4	3,0	12,0	25,2
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	27,8	45,4	13,0	n.a	n.a	10,2	36,7	40,4	39,2	49,6

Indicadores-Chave		Cunene	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	72,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	59,6	77,9	43,7	n.a	n.a	41,3	54,1	62,2	74,4	87,5
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	62,1	69,6	56,4	n.a	n.a	55,8	59,5	64,2	66,9	76,9
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	3,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	88,8	89,0	88,8	85,1	92,9	88,1	87,5	86,7	94,7	92,8
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	1,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	8,9	4,7	10,7	7,4	10,4	10,9	17,1	2,6	1,2	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	25,6	33,1	22,3	27,0	24,1	22,6	31,0	32,7	24,2	35,3
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	17,6	22,2	15,6	15,4	20,1	15,2	21,7	22,7	23,0	17,1
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	92,4	97,6	90,2	94,7	89,5	88,5	100,0	100,0	93,4	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	57,1	na	na	na	na	na	na	na	na	na
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	39,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	6,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	0,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	65,4	98,5	48,9	65,0	65,8	49,2	57,3	95,8	99,8	96,7
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	17,2	30,3	10,8	17,1	17,4	8,8	19,4	27,0	41,7	27,2
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	21,7	64,3	0,4	22,2	21,2	0,0	2,8	23,5	77,0	91,9
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	4,6	13,5	0,2	5,1	4,1	0,0	3,3	26,1	11,1	5,4
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	90,2	95,0	85,0	na	na	84,5	87,1	82,6	93,1	98,2

Indicadores-Chave		Cunene	Área de Residência		Sexo da Criança/Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	29,9	75,3	3,9	n.a	n.a	1,2	8,4	58,2	96,3	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	71,5	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	29,2	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	22,2	42,3	14,7	22,9	21,5	15,1	13,9	24,9	48,0	58,1
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	51,6	82,9	36,3	51,5	51,8	34,1	50,7	67,9	88,1	94,7
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	4,5	5,8	3,9	3,9	5,1	4,3	1,7	15,0	0,0	1,8
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	4,2	5,1	3,7	3,7	4,6	4,3	1,4	12,7	0,0	1,9
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	6,0	8,9	4,8	6,1	6,0	4,8	6,1	7,3	10,3	8,4
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	9,1	16,4	5,4	9,3	8,9	5,6	9,2	16,1	10,5	20,4
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	11,9	0,3	21,0	11,8	12,1	22,8	5,9	0,0	1,6	0,0
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	17,8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

- n.a Não aplicável
- n.d Não disponível
- n.f Estimativa não fiável
- * Censo 2024, resultados definitivos
- 1 Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio
- 2 As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH
- 3 Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



LUNDA SUL

INDICADORES LUNDA SUL

Quadro 19 - Indicadores - Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança Província da Lunda Sul

Indicadores-Chave		Lunda Sul	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	893 936	675 102	218 834	448 936	445 000	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	17,0	17,8	13,4	15,0	19,2	16,9	13,3	15,2	23,5	18,4
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	39,5	39,5	39,8	39,2	39,8	39,4	40,9	37,4	43,4	36,8
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	19,3	20,6	14,1	n.a	n.a	13,1	17,4	20,6	20,5	21,4
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	15,2	11,9	49,7	n.a	n.a	53,8	40,3	13,5	4,3	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	4,9	3,9	8,5	n.a	n.a	9,3	0,0	7,9	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	5,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	11	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	17	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	18,1	21,1	6,7	12,5	24,5	5,3	5,3	17,5	33,3	33,3
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	83,5	87,6	40,1	n.a	n.a	14,3	57,5	88,5	92,9	100,0
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	93,7	97,2	80,4	n.a	n.a	78,2	66,5	100,0	100,0	100,0

Indicadores-Chave		Lunda Sul	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	80,2	nd	nd	78,2	81,8	nd	nd	nd	nd	nd
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	47,6	nd	nd	47,5	47,7	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	16,4	14,5	26,5	14,7	17,8	32,1	23,1	15,22	8,94	12,6
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	1,0	2,0	3,0	4,0	3,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	16,2	17,5	9,0	7,9	25,3	10,4	12,8	19,4	12,0	22,3
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	5,0	6,1	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	9,8	2,3	3,1
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	0,3	0,4	0,0	n.a	n.a	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	64,5	74,9	15,7	n.a	n.a	5,1	54,5	67,0	86,4	89,4
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	24,2	25,9	0,0	n.a	n.a	0,0	1,6	20,6	37,1	38,6
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	34,1	35,1	29,9	n.a	n.a	28,3	32,7	29,1	49,3	35,7
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	20,6	20,2	23,4	20,9	20,4	25,8	13,6	17,0	26,7	36,3
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	20,2	17,6	40,8	n.a	n.a	38,2	13,6	17,4	28,9	26,6
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	15,6	14,6	22,1	14,6	16,7	18,4	15,9	12,4	17,6	26,1
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	69,6	73,8	45,4	n.a	n.a	31,4	65,5	68,1	84,2	78,3
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	6,3	4,3	18,1	n.a	n.a	34,4	2,0	6,0	3,1	0,0
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	52,7	58,2	21,1	n.a	n.a	16,7	24,0	47,7	80,4	92,5
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	20,8	23,1	9,7	n.a	n.a	7,2	32,0	10,9	38,8	25,4

Indicadores-Chave		Lunda Sul	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	16,3	17,1	5,1	n.a	n.a	0,0	4,1	11,7	25,0	31,7
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	54,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	41,5	46,2	19,3	n.a	n.a	12,2	30,7	47,2	55,0	33,6
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	21,3	22,6	9,9	n.a	n.a	8,3	12,7	13,2	37,2	36,2
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	4,9	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	75,8	77,5	65,7	73,8	77,1	64,4	71,1	76,5	75,9	93,2
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	8,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	0,4	0,4	0,5	0,1	0,7	0,0	1,1	0,5	0,0	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	11,6	11,5	12,3	11,9	11,2	11,2	11,5	14,3	9,5	1,1
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	11,0	12,1	3,9	10,3	11,8	2,0	9,9	10,5	12,7	21,2
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	86,6	90,5	45,9	72,7	93,4	40,2	79,4	85,2	100,0	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	50,1	na	na	na	na	na	na	na	na	na
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	36,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	4,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	1,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	73,6	78,5	45,7	73,5	73,7	41,6	50,1	82,5	85,5	72,3
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	22,4	25,9	2,6	20,4	24,4	0,7	2,5	19,3	34,3	60,1
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	48,4	56,0	5,2	45,5	51,3	0,0	26,9	48,5	63,0	93,6
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	36,8	42,4	4,7	38,8	34,9	0,0	40,6	50,8	35,2	6,4

Indicadores-Chave		Lunda Sul	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	90,6	90,5	92,8	na	na	100,0	88,7	94,8	95,3	53,3
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	76,5	90,0	20,6	n.a	n.a	12,0	33,4	96,3	100,0	100,0
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	99,4	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	43,4	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	70,8	72,2	61,7	74,2	67,1	62,2	70,1	69,3	74,8	78,5
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	96,4	96,8	94,3	96,8	96,0	96,8	94,0	95,9	98,0	97,8
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	2,0	2,4	0,1	2,1	2,0	0,1	0,8	3,1	0,8	4,1
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	3,0	3,5	0,3	2,6	3,4	0,2	1,2	5,2	1,0	4,1
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	10,8	11,5	6,6	11,1	10,5	5,1	21,1	9,9	9,5	6,1
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	14,4	15,9	7,5	15,8	13,2	6,3	23,6	14,3	14,3	9,6
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	7,8	7,0	12,7	10,0	6,2	3,9	13,6	11,5	2,1	1,7
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	10,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável

n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).

INDICADORES BENGO

Quadro 20 - Indicadores-Chave relacionados aos 11 Compromissos com a Criança Província do Bengo

Indicadores-Chave		Bengo	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
A. Dados Demográficos de Base											
A01.	População total (em `1.000´ de pessoas) (*)	716 335	374 187	342 149	359 163	357 172	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
A02.	Proporção média de crianças menores de 5 anos nos agregados familiares (%)	18,3	17,6	18,8	18,2	18,3	18,6	20,9	17,2	15,4	19,3
A03.	Proporção média de crianças com 5-17 anos de idade nos agregados familiares (%)	37,0	37,2	36,8	39,4	34,6	32,1	37,8	37,7	39,1	35,6
A04.	Proporção média de mulheres com 15-49 anos de idade nos agregados familiares (%)	22,7	25,5	20,5	n.a	n.a	18,6	19,8	23,7	25,2	27,4
A05.	Proporção média de mulheres com 15-19 anos de idade, casadas ou em união de facto (%)	20,9	5,1	29,8	n.a	n.a	51,6	22,7	15,1	4,4	0,0
A07.	Proporção média de homens com 15-19 anos de idade, casados ou em união de facto (%)	1,7	0,0	2,5	n.a	n.a	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
A08.	Taxa global de fecundidade (%)	5,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A09.	Taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	12	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A10.	Taxa de mortalidade infanto-juvenil (óbitos por mil nascidos vivos)	14	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A11.	Taxa de mortalidade neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A12.	Taxa de mortalidade pós-neonatal (óbitos por mil nascidos vivos)	8	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
A13.	Taxa de mortalidade pós-infantil (óbitos por mil nascidos vivos)	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
B. Compromissos 4 e 5 - Educação da Primeira Infância, Educação Primária e Formação Profissional											
B01.	Proporção de crianças com 5 anos que frequentam o ensino primário (um ano antes do início da idade oficial para frequentar o ensino primário) (%)	27,4	18,2	21,6	20,4	19,6	14,3	21,4	15,0	20,0	30,8
B02.	Taxa de alfabetização entre os homens com 12-18 anos de idade (%)	68,8	79,7	62,5	n.a	n.a	46,9	63,4	63,4	93,0	94,2
B03.	Taxa de alfabetização entre as mulheres com 12-18 anos de idade (%)	91,6	93,4	90,9	n.a	n.a	96,0	89,7	88,9	93,5	90,2
B04.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino primário (%)	74,7	nd	nd	78,6	71,0	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Bengo	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
B05.	Taxa líquida de frequência escolar no ensino secundário (%)	34	nd	nd	35,2	32,6	nd	nd	nd	nd	nd
B06.	Proporção de indivíduos com 6-17 anos de idade que nunca frequentaram a escola (%)	15,7	8,3	19,2	15,1	16,3	28,3	15,1	15,41	8,716	3,7
B10.	Mediana de anos completados de escolarização entre os indivíduos com 6-17 anos de idade (%)	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0	2,0	4,0	4,0
B11.	Proporção da população com 15-24 anos de idade que não estuda e não trabalha (%)	9,3	10,5	8,1	7,2	11,3	5,6	7,1	11,1	11,0	9,7
B12.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	3,3	4,9	2,5	n.a	n.a	0,0	5,6	3,3	5,8	0,0
B13.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que tem acesso aos meios de comunicação ¹ pelo menos, uma vez por semana (%)	2,5	6,0	0,4	n.a	n.a	0,0	0,0	4,2	3,3	8,0
B14.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	23,8	52,8	9,6	n.a	n.a	3,4	12,3	31,3	49,9	69,0
B15.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que usou internet nos últimos 12 meses (%)	21,1	48,5	4,7	n.a	n.a	0,0	3,3	19,8	47,6	72,3
C. Compromissos 1, 7 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Prevenção, Tratamento, Apoio e Redução do Impacto do VIH/ SIDA nas Famílias e nas Crianças e Protecção Social e Competências Familiares											
C01.	Proporção de agregados familiares que possuem pelo menos uma rede de mosquiteira (%)	37,8	41,5	36,2	n.a	n.a	31,0	34,5	45,4	39,5	49,3
C02.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	15,1	19,9	13,0	15,7	14,5	12,5	10,2	19,3	13,3	34,5
C03.	Proporção de mulheres grávidas com 15-49 anos de idade que dormiram debaixo de uma rede de mosquiteiro tratada com insecticida na noite anterior ao inquérito (%)	20,7	16,4	22,4	n.a	n.a	12,2	18,3	48,2	0,0	0,0
C04.	Proporção de crianças com 0-4 anos de idade que tiveram febre ou malária nas últimas duas semanas e foi procurado aconselhamento ou tratamento no mesmo dia ou no dia seguinte (%)	14,5	14,3	14,5	12,6	16,2	16,3	17,3	12,3	8,2	14,3
C05.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um parto nos dois anos anteriores ao inquérito e tomaram duas ou mais doses de SP/Fansidar durante a última gravidez (%)	44,4	64,1	36,8	n.a	n.a	35,5	32,1	52,9	66,4	73,4
C06.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito e não fizeram nenhuma consulta pré-natal durante a última gravidez (%)	18,9	13,0	21,2	n.a	n.a	19,8	27,0	13,3	13,4	3,8
C07.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito, cujo parto foi realizado numa unidade de saúde (%)	55,1	77,6	46,2	n.a	n.a	49,8	40,4	58,5	83,2	91,0
C09.	Proporção de homens com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	14,2	22,5	10,1	n.a	n.a	6,5	14,6	14,7	20,3	25,7
C10.	Proporção de mulheres com 15-24 anos de idade que conhecem as principais formas de transmissão sexual ² e as principais concepções erradas ³ sobre o VIH e SIDA (%)	15,3	24,7	9,6	n.a	n.a	6,1	12,8	12,5	27,0	28,7
C11.	Proporção de mulheres com 15-49 anos de idade com um nado vivo nos dois anos anteriores ao inquérito que recebeu aconselhamento, fez o teste para o VIH durante uma consulta pré-natal e recebeu o resultado (%)	53,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Indicadores-Chave		Bengo	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
C12.	Proporção de homens com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	50,0	64,1	42,2	n.a	n.a	18,0	50,0	51,7	63,5	77,1
C13.	Proporção de mulheres com 15 - 49 anos de idade que sabe que o risco de transmissão de mãe para filho (TMPF) pode ser reduzido se a mãe tomar medicamentos especiais (%)	48,9	66,9	38,4	n.a	n.a	37,9	30,5	55,2	66,0	79,1
C14.	Prevalência do VIH na população de 15-49 anos de idade (%)	1,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C15.	Proporção de crianças nascidas vivas nos dois anos anteriores ao inquérito que foi exclusivamente amamentada nos primeiros dois dias após o nascimento (%)	72,2	79,3	69,4	64,1	80,3	55,2	66,0	86,4	87,1	87,1
C16.	Prevalência da malária nas crianças de 6-59 meses de idade (%)	36,6	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C17.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de Infecção respiratória aguda (%)	1,9	1,0	2,2	3,1	0,7	0,0	3,5	2,8	0,0	0,0
C18.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade que tiveram diarreia nas duas semanas anteriores ao inquérito (%)	14,3	14,9	14,1	13,8	14,8	9,2	15,9	16,0	13,4	17,6
C19.	Proporção de crianças menores de 5 anos cuja monitoria de medição de peso e altura foram realizadas por um profissional de saúde nos 3 meses anteriores ao inquérito (%)	48,2	59,5	43,7	41,8	54,5	39,8	40,5	54,1	68,0	54,3
C20.	Proporção de crianças de 12-23 meses de idade que possuem ou alguma vez possuíram o cartão ou registo de vacinas (%)	68,0	78,7	64,2	69,4	66,6	82,2	52,9	68,7	72,9	100,0
C25.	Proporção de mulheres na participação de tomada de decisões relativamente à saúde reprodutiva e sexual (%)	20,4	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C26.	Prevalência da desnutrição crónica nas crianças menores de 5 anos (%)	43,5	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C27.	Prevalência da desnutrição aguda nas crianças menores de 5 anos (%)	6,2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
C28.	Prevalência do sobrepeso nas crianças menores de 5 anos (%)	2,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
D. Compromissos 1 e 9 - Esperança de Vida ao Nascer, Protecção Social e Competências Familiares											
D01.	Proporção da população que usa fontes apropriadas de água para beber (%)	50,0	94,1	29,1	49,8	50,1	23,3	30,7	59,6	91,2	92,8
D02.	Proporção da população que dá tratamento apropriado à água para beber (%)	30,8	47,5	23,0	30,3	31,3	11,2	21,5	41,1	47,7	57,6
D03.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas não compartilhadas (%)	37,1	61,7	25,5	37,4	36,7	6,9	28,6	38,3	66,2	90,5
D04.	Proporção da população com instalações sanitárias adequadas compartilhadas (%)	16,0	21,7	13,3	15,2	16,8	5,8	13,6	24,0	29,5	4,6
D05.	Proporção de mulheres de 12-19 anos capaz de lavar-se e mudar de roupa com privacidade e que usaram materiais apropriados durante a última menstruação (%)	97,2	96,2	97,9	na	na	93,1	98,5	98,8	94,2	97,1
D06.	Proporção de agregados familiares com acesso a electricidade (%)	37,6	83,3	18,5	n.a	n.a	0,0	7,4	68,7	99,4	100,0

Indicadores-Chave		Bengo	Área de Residência		Sexo da Criança/ Indivíduo		Grupos de Rendimento				
			Urbana	Rural	Masculino	Feminino	1º Quintil (20% mais pobres)	2º Quintil	3º Quintil	4º Quintil	5º Quintil (20% mais ricos)
D08.	Percentagem da população que lavou as mãos (%)	37,4	na	na	na	na	na	na	na	na	na
D09.	Proporção da população de jure que depende de tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (%)	46,0	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
F. Compromissos 3 - Registo de Nascimento											
F01.	Proporção de crianças menores de cinco anos de idade com registo de nascimento (%)	44,5	50,0	42,1	44,9	44,0	36,3	41,5	44,7	50,7	75,6
F02.	Proporção de crianças de 6-17 anos de idade com registo de nascimento (%)	85,8	86,4	85,5	87,7	83,8	81,8	86,0	85,3	86,2	94,6
G. Compromissos 8 e 9 - Prevenção e Combate á Violência Contra a Criança, Protecção Social e Competências Familiares											
G01.	Proporção de crianças de 5-14 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	38,5	27,9	42,9	37,9	39,1	35,9	50,9	23,8	39,7	27,3
G02.	Proporção de crianças de 5-17 anos envolvida em alguma actividade económica remunerada (em dinheiro ou em espécie) de pelo menos 1 hora (%)	39,6	28,1	44,5	38,7	40,5	35,7	54,4	23,7	38,2	26,5
G03.	Proporção de crianças com 0 - 17 anos de idade com um ou ambos os pais falecidos (%)	7,2	7,6	7,0	7,1	7,3	5,4	7,3	7,0	11,9	2,9
G04.	Proporção de crianças com 10-14 anos de idade com um ou ambos pais falecidos, que alguma vez frequentou a escola (%)	9,6	7,2	10,7	8,4	11,0	8,4	11,2	8,6	11,5	3,1
G05.	Proporção de crianças de 6-11 anos de idade que beneficiou da merenda escolar (%)	56,3	24,0	66,7	52,5	60,2	77,3	63,6	56,1	25,1	18,2
G09.	Percentagem de crianças dos 5 - 17 anos com dificuldades funcionais em pelo menos um domínio (ver, ouvir, caminhar, cuidados pessoais, comunicação, aprendizagem, lembrar-se, concentrar-se, aceitar mudanças, controlar o comportamento, fazer amigos, ansiedade, depressão) (%)	4,7	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

Legenda:

n.a Não aplicável
n.d Não disponível

n.f Estimativa não fiável

* Censo 2024, resultados definitivos

¹ Lê um jornal, assiste televisão e ouve rádio

² As duas concepções erradas mais comuns são: picadas de mosquitos e partilhar comida com alguém que tem o VIH

³ Conhecimento abrangente sobre o VIH significa saber que o uso consistente do preservativo durante as relações sexuais e ter um único parceiro fiel e não infectado pode reduzir o risco de contágio com o VIH; saber que uma pessoa aparentemente saudável pode ter o VIH; e rejeitar as duas concepções erradas mais comuns sobre a transmissão ou prevenção do VIH (contrair o VIH através de picada de mosquito ou por comer com uma pessoa que tem o VIH).



Instituto Nacional de Estatística
Av. Ho-Chi-Minh
Luanda - Angola
Tel.: (+244) 924 354 015
<https://www.ine.gov.ao>
geral@ine.gov.ao