

PROVINCE DU KINSHASA

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO



ENQUETE DEMOGRAPHIQUE
ET DE SANTE 2023 - 2024
(EDS-RDC-III)





**RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO**

La troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS-RDC III)

a été réalisée par l'Institut National de la Statistique (INS), avec l'appui de l'École de Santé Publique de l'Université de Kinshasa (ESPK). La réalisation technique de l'enquête a été confiée à une équipe de gestion composée d'un expert de l'Ecole des Sciences de la Population et du Développement de l'université de Kinshasa (ESPD) qui a assumé la coordination nationale, des experts de l'INS, de l'ESPK, du Ministère du Plan et Coordination de l'Aide au Développement et du Ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. L'ICF a fourni l'assistance technique à l'ensemble du projet par le biais du DHS Program. En outre, l'USAID, la Banque mondiale, le Fonds mondial, l'UNICEF, l'UNFPA, et le Gouvernement de la RDC ont contribué, sur le plan financier et technique, à la réalisation de cette enquête.



Le contenu de cette présentation relève de la seule responsabilité de l'INS et de l'ICF et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USAID, du Gouvernement des États-Unis et d'autres organismes donateurs.

L'ENQUÊTE

- L'EDS-RDC III est la 3^{ème} Enquête Démographique et de Santé réalisée en RDC depuis 2007 dans le cadre du DHS Program.
- Elle est conçue pour produire des résultats représentatifs au niveau de l'ensemble du pays, au niveau de chaque milieu de résidence (urbain, rural), et au niveau de chacune des 26 provinces de la RDC.
- L'objectif de ce profil provincial est de diffuser certaines conclusions de l'enquête EDS RDC III 2023-2024. Les données exploitées se trouvent dans les tableaux du rapport national de l'enquête EDS-RDC III.

RÉSULTATS DES INTERVIEWS DES MÉNAGES ET INDIVIDUELS AU NIVEAU DE LA PROVINCE DE KINSHASA

Interviews ménages

Ménages sélectionnés	1190
Ménages occupés	1182
Ménages interviewés	1 181
Taux de réponse	99,2%

Interviews des femmes de 15-49 ans

Femmes éligibles	1583
Femmes interviewées	1544
Taux de réponse	97,5%


Interviews des hommes de 15-59 ans

Hommes éligibles	616
Hommes interviewés	583
Taux de réponse	100,0%




CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION DES MÉNAGES

1. Quintiles de bien-être économique




Répartition de la population de droit par quintile de bien-être économique

2. Niveau d'instruction des femmes et des hommes




Répartition des femmes et des hommes de 15-49 ans en fonction de plus haut niveau atteint

3. Alphabétisation des femmes et des hommes




Pourcentage des femmes et des hommes de 15-49 ans alphabétisés

4. Exposition aux mass media




Pourcentage des femmes et des hommes de 15-49 ans qui sont exposés à certains médias au moins une fois par semaine

5. Occupation des femmes et des hommes




Répartition des femmes et des hommes qui travaillaient au cours de 12 derniers mois ayant précédé l'enquête par type d'occupation

6. Migration récente



% des femmes et les hommes de 15-49 ans qui ont toujours vécu dans le lieu de résidence actuel et qui sont nées hors de la résidence actuelles et ; parmi ces derniers, % de ceux qui ont emménagé dans leurs lieux de résidence actuelle au cours de 5 dernières années

7. Raison de la migration



% des femmes et des hommes de 15-49 ans qui ont emménagé dans leur lieu de résidence actuel selon la raison de la migration.

Un peu plus de 8 personnes sur dix (82%) appartiennent au groupe des ménages le plus riches.

Un peu plus de 9 hommes sur 10 sont alphabétisés contre 8 femmes sur 10. Les femmes alphabétisées sont donc un peu moins nombreuses que les hommes, soit 83% contre 94%.

La majorité des personnes regarde la télévision (70% chez les femmes et 74% chez les hommes).


L'activité qui occupe le plus la population reste celle de vente et service (49% d'hommes et 73% de femmes).

Quatre femmes sur dix (40%) contre un peu moins de 4 hommes sur dix (38%) vivant hors du lieu de résidence actuel ont donc migré ; un peu moins de deux femmes sur dix (15%) des femmes et 3 hommes sur dix (31%) ont migré au cours des cinq dernières années. Les principales raisons de la migration sont le rapprochement familial. 58% pour les femmes et 48% pour les hommes, puis le mariage par les femmes (19%), les études chez les hommes (32%).




EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT

1. Échelle des services d'eau de boisson




Répartition de la population de droit par échelle des services d'eau de boisson

2. Disponibilité d'eau à boire en quantités suffisantes




Pourcentage de la population de droit disposant des quantités suffisantes d'eau à boire

3. Échelle des services d'assainissement




Répartition de la population de droit par échelle des services d'assainissement

4. Gestion des excréments humains des ménages




Répartition de la population de droit par gestion des excréments humains d'installations Sanitaires des ménages

5. Lavage des mains selon le milieu de résidence et la province




Pourcentage de la population de droit disposant des installations de lavage des mains avec du savon et de l'eau

6. Moyen de traitement de l'eau de boisson des ménages



Pourcentage de la population de droit utilisant diverses méthodes pour traiter l'eau de boisson

7. Hygiène menstruelle selon le milieu de résidence et la province



Pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant pu se laver ou se changer en privées et ayant utilisé des matériaux appropriés au cours de leur période menstruelle



La quasi-totalité de la population des ménages (95%) dispose d'au moins un service élémentaire d'eau de boisson.

Un peu plus de trois quarts de la population (79%) disposent des quantités suffisantes d'eau à boire.

Près de la moitié de la population (48%) disposent d'un service des installations sanitaires limité.

Un peu plus de 4 ménages sur dix 43% dispose des installations de lavage de mains avec du savon et de l'eau.


La majorité des femmes (91%) ont pu se laver ou se changer en privé et utilisé des matériaux appropriés au cours de leur période menstruelle.






FECONDITE

1. Indice synthétique de fécondité




Nombre moyen d'enfant par femme pour les trois années précédant l'enquête

2. Intervalles intergénéraliques




Nombre médian des mois depuis la naissance vivante précédente

3. Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum




Nombre médian des mois d'aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum à la suite de naissance vivante ou mort-né survenus au cours de trois années ayant précédé l'enquête

4. Age à la première union




Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans en union avant l'âge de 15 ans ou 18 ans

5. Grossesse chez les adolescentes




Pourcentage des femmes de 15-19 ans qui ont déjà été enceintes

6. âge à la première naissance



Age médian à la première naissance parmi les femmes de 25-49 ans

7. Taux de fécondité désirée



Le nombre moyen d'enfant par femme (9,2) pour les trois années précédentes l'enquête se situe largement au dessus de la moyenne nationale (5,5).

Pour la moitié des femmes, la durée depuis la naissance vivante précédente est de plus de trois ans (38,4 mois).

Pour 50% des femmes, la durée pendant laquelle une femme ne peut pas tomber enceinte est de moins d'une année en raison de l'absence des règles (5,5 mois), de l'abstinence (3,1 mois) ou de l'insusceptibilité post-partum.

La moitié des femmes âgées actuellement de 25-49 ans ont eu leur première naissance à l'âge d'environ 24 ans.


Le nombre moyen d'enfant désiré reste inférieur au nombre d'enfants réel durant la période des trois ans précédant l'enquête.

Près d'1 adolescente de 15-19 ans sur 4 (23%) a déjà été enceinte.




PLANIFICATION FAMILIALE

1. Connaissance de la Planification Familiale




Pourcentage des femmes et des hommes qui ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive

3. Besoins et demande en matière de Planification Familiale




Pourcentage de toutes les femmes de 15-49 ans, ayant des besoins satisfaits ou non satisfaits en matière de planification familiale

5. Prise de décision concernant la Planification Familiale




2. Utilisation de la Planification Familiale



Répartition des femmes de 15-49 ans actuellement en union par méthode contraceptive actuellement utilisée

4. Exposition aux messages sur la Planification Familiale




Pourcentage des femmes et des hommes qui ont entendu ou vu des messages spécifiques sur la planification dans les 12 derniers mois

■ RDC Urbain ■ RDC Rural ■ Kinshasa

Répartition des femmes de 15-49 ans en union en fonction de la personne qui prend habituellement la décision d'utiliser ou pas la PF et % qui participe à la décision

6. Désir de limiter les naissances



Pourcentage des femmes et des hommes en union qui ne veulent plus d'enfants



La quasi-totalité des femmes (99%) ont entendu parler d'au moins une méthode contraceptive.

L'utilisation de la planification familiale reste faible : près de 3 femmes sur 10 (28%) utilisent une méthode contraceptive et environ 2 sur 10, une méthode moderne (18%) ou traditionnelle (11%).

Plus de la moitié des femmes de 15 à 49 ans (56%) n'ont aucun besoin en matière de planification familiale, tandis que 2 femmes sur 10 (20%) ont des besoins non satisfaits en matière de planification familiale.


Les femmes et les hommes sont exposés aux messages spécifiques sur la planification familiale essentiellement par la télévision, la publicité et par la radio. Par ailleurs la moitié des femmes et des hommes ne sont pas exposés aux messages sur la planification familiale à partir des médias susmentionnés.

Un peu plus de sept femmes de 15 à 49 ans sur 10 (76%) participent à la prise de décision sur la planification familiale. Une femme sur trois (33%) et près de 3 hommes sur 10 (28%) ne désirent plus avoir des enfants.




NUTRITION

1. Diversité alimentaire




Pourcentage des enfants de 6-23 mois vivant avec leur mère ayant une diversité et un apport alimentaire minimum acceptable

3. État nutritionnel des enfants de moins de 5 ans




Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition selon les trois indices anthropométriques de mesure de la croissance de l'enfant

5. Prévalence de l'anémie chez les enfants




Pourcentage d'enfants de 6-59 mois atteints d'anémie

2. Allaitement selon l'âge




Pourcentage des jeunes enfants de 0-5 mois vivant avec leur mère exclusivement allaitée

4. État nutritionnel des femmes de 20-49 ans et des adolescentes de 15-19 ans



Pourcentage des femmes de 20-49 ans et de 15-19 ans ayant certains niveaux d'Indice de Masse Corporelle

6. Prévalence de l'anémie chez les femmes



Pourcentage des femmes de 15-49 ans atteintes d'anémie



Parmi les jeunes enfants de 0-5 mois vivant avec leur mère, un enfant sur quatre (25%) sont exclusivement allaités.

Parmi les enfants de moins de 5 ans, environ un enfant sur 10 (14%) souffrent d'un retard de croissance) et près d'un enfants sur 10 (8%) souffrent d'insuffisance pondérale.

Près de la moitié des enfants (47%) nés au cours des deux dernières années ont commencé à être allaités dans l'heure qui a suivi la naissance.

Parmi les femmes de 20-49 ans, 2%, souffrent d'une maigreur modérée ou sévère tandis que 28% souffrent de surcharge pondérale. Quant aux adolescentes de 15-19 ans, la proportions est la même pour celles qui souffrent d'une maigreur modérée ou sévère tandis que 8% souffrent de surcharge pondérale.


Parmi les enfants de 6-59 mois, 29% souffrent d'anémie modérée et 28% d'anémie légère.

Parmi les femmes de 15-49 ans, 23% souffrent d'anémie modérée et 28% d'anémie légère.




SANTE DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NE

1. Soins prénatals




Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante ou un mort-né au cours de deux années ayant précédé l'enquête n'ayant pas reçu des soins prénatals

3. Lieu d'accouchement




Pourcentage des naissances vivantes ou mort-nés ayant eu lieu au cours de deux années ayant précédé l'enquête dont l'accouchement s'est déroulé à la maison ou dans un établissement de santé

5. Traitement préventif intermittent




Pourcentage des femmes 15-49 ans ayant eu une naissance vivante ou un mort-né au cours de deux années ayant précédé l'enquête qui ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar

2. Visites prénatales et stade de la grossesse à la première visite




Proportion des femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante ou un mort-né au cours de deux années ayant précédé l'enquête par nombre de visites prénatales durant la grossesse

4. Vaccination antitétanique



Pourcentage des femmes 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours de deux années ayant précédé l'enquête dont la naissance vivante la plus récente est protégée contre le tétanos néonatal

6. Problèmes d'accès aux soins de santé



Pourcentage des femmes de 15-49 ans qui ont déclaré qu'elles avaient les problèmes importants d'accès au soins de santé quand elles étaient malades, par type de problème



Moins d'une femme de 15-49 ans sur 20 (5%) qui ont eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des deux années ayant précédé l'enquête, n'ont pas reçu des soins prénatals.


Parmi les femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des deux années ayant précédé l'enquête, près de trois quart (69%) ont reçu 4 visites prénatales ou plus. Par ailleurs, environ 4 femmes sur 10 (42%) ont effectué leurs premières visites prénatals avant 4 mois.

Parmi les naissances vivantes ou mort-nés qui ont eu lieu au cours de deux années ayant précédé l'enquête, la quasi-totalité (97%) sont survenues dans un établissement de santé; tandis que moins d'une naissance (3%) sont survenues à domicile.

Parmi les femmes qui ont eu leur naissance vivante au cours de deux années précédant l'enquête, 7 sur 10 ont vu leur naissance la plus récente protégée contre le tétanos néonatal.

Parmi les femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante ou un mort-né au cours des deux années ayant précédé l'enquête, un environ 4 femme sur 10 (37%) ont reçu trois doses ou plus de SP/Fansidar.


Parmi les problèmes d'accès au soins de santé rencontrés par les femmes de 15-49 ans, les plus importants sont : obtenir l'argent pour se faire soigner (33%) et obtenir la permission pour aller se faire soigner (10%).






SANTÉ DE L'ENFANT

1. Vaccination



Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête


2. Enfants avec de la diarrhée



■ Enfant avec la Diarrhée ■ Conseil ou traitement recherché

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours de deux semaines ayant précédé l'enquête et pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés


3. Enfants avec de la Fièvre



■ Enfant avec la fièvre ■ Conseil ou traitement recherché

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant eu la fièvre au cours de deux semaines ayant précédé l'enquête et pourcentage pour lesquels des conseils ou un traitement ont été recherchés

4. Couverture du test et prévalence du PALU



Pourcentage d'enfants de 6-59 mois qui ont été testés (TDR) et prévalence du paludisme




Parmi les enfants de 12-23 mois qui ont reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête, 4 enfants sur 10 sont complètement vaccinés aux antigènes de base (42%); près de 3 enfants sur 10 (29%) est complètement vacciné selon le calendrier national. Par ailleurs, moins d'un enfant sur 10 (1%) n'a reçu aucun vaccin. Entre la première et la troisième doses, on observe tout de même une légère déperdition pour tous les antigènes à dose multiple.

Au cours de deux semaines ayant précédé l'enquête, un peu plus d'1 enfant de moins de 5 ans sur 10 (12%) ont fait la diarrhée, et parmi eux, des conseils ou un traitement ont été recherchés pour un peu plus de 3 enfants sur 10 (32%).

Au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête, un peu plus d'1 enfant sur 10 (15%) a fait de la fièvre et des conseils ou un traitement ont été recherchés pour un peu plus de quatre enfants sur dix (44%).


Plus des trois quarts (87%) des enfants de 6-59 mois éligibles à l'enquête ont été soumis au Test de Diagnostic Rapide (TDR du Paludisme et rien qu'un enfant sur 20 (5%) ont été testés positifs.






MOUSTIQUAIRES IMPRÉGNÉES D'INSECTICIDE

1. Possession de moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)




Pourcentage des ménages avec au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide

2. Accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII)




Pourcentage de la population de fait ayant accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide dans le ménage

3. Utilisation des MII par la population




Pourcentage de la population des ménages ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédant l'enquête

4. Utilisation des MII par les enfants de moins de 5 ans




Pourcentage des enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédant l'enquête

5. Utilisation des MII par les femmes enceintes



Pourcentage des femmes enceintes ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédant l'enquête

6. Source d'obtention des moustiquaires



Répartition (en %) des moustiquaires imprégnées d'insecticide ou non par source d'obtention



Près de la moitié des ménages (49%) possèdent au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide.

Près de 4 personnes sur 10 (35%) ont accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticide dans le ménage.

Environ un tiers (31%) de la population des ménages ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédant l'enquête.

Un peu moins de 4 enfants de moins de 5 ans sur 10 (37%) ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédant l'enquête.

Un peu moins de 4 femmes enceintes sur 10 (38%) ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide la nuit précédant l'enquête.


Un peu moins des trois quarts des MII (69%) sont obtenues au cours des campagnes de distribution de masse.






VIH ET COMPORTEMENTS SEXUELS A HAUTS RISQUES

1. Connaissance du VIH ou du sida




Pourcentage des femmes et d'hommes qui ont entendu parler du VIH ou du Sida

2. Attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH




Pourcentage des femmes et d'hommes ayant des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH

3. Couverture du test avant l'enquête




Pourcentage des femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant fait un test de VIH au cours de 12 derniers mois et ayant reçu le résultat du dernier test.

4. Partenaires sexuels multiples et rapports sexuels à hauts risques




Pourcentage des femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant eu deux partenaires sexuels ou plus au cours de 12 derniers mois

5. Couverture du test du VIH pendant l'enquête



Pourcentage des femmes et d'hommes de 15-49 ans dont le DBS (gouttes de sang séchées) a été testé pendant l'enquête

6. Prévalence du VIH dans la population de 15-49 ans



Pourcentage du VIH positif parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans testés



La quasi-totalité des femmes (96%) et des hommes (97%) ont entendu parler du VIH ou du Sida.

Près de 6 femmes sur 10 (55%) et un peu moins de 6 hommes sur 10 (52%) ont des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH.

Près de 9 femmes sur 10 (87%) et 8 hommes sur 10 (81%) âgés de 15-49 ans ont fait un test du VIH au cours de 12 derniers mois et ont reçu le résultat du dernier test.

Moins d'une femme sur 10 (3%) et un peu plus d'un homme sur 10 (14%) ont eu 2 partenaires sexuels ou plus au cours de 12 derniers mois.


Des gouttes de sang séchées de 87% des femmes et 81% des hommes âgés de 15-49 ans ont été testées pendant l'enquête.

La prévalence du VIH Sida parmi les femmes et les hommes de 15-49 ans testés se situe à moins de 1%.




POUVOIR D'ACTION DES FEMMES

1. Contrôle sur le revenu des femmes




Pourcentage des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui ont gagné de l'argent pour leur travail au cours des 12 mois en fonction de la personne qui décide comment est utilisé l'argent gagné par la femme.

3. Opinions concernant le fait qu'un mari batte sa femme




Pourcentage de toutes les femmes et des hommes de 15-49 ans qui pensent qu'il est justifié que, pour certaines raisons, un mari batte sa femme.

5. Participation des femmes dans la prise de décision concernant la santé sexuelle et reproductive




2. Participation dans la prise de décision



Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui habituellement prennent certaines décisions, soit seules, soit en commun avec leur conjoint.

4. Négociation des rapports sexuels



Pourcentage de femmes de 15-49 ans, actuellement en union, qui peuvent refuser des rapports sexuels à leur mari quand elles ne souhaitent pas en avoir.

Pourcentage de femmes de 15-49 ans actuellement en union qui prennent leurs propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation de la contraception et les soins de santé reproductive



La décision sur l'utilisation de l'argent gagné par les femmes de 15-49 ans en union est prise dans 44% de cas principalement par la femme; dans 42% par la femme et le conjoint ensemble; dans 14% autres, principalement par le conjoint.

Les décisions prises par les femmes de 15-49 ans en union seule ou en commun avec leur conjoint concernent beaucoup les visites à sa famille ou parents et les achats importants du ménage.

Environ trois femmes sur dix (29%) de 15-49 ans, actuellement en union, prend ses propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation de la contraception et les soins de santé reproductive.


Près de quatre femmes sur 10 (36%) et près de trois hommes sur dix (29%) pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme lorsqu'elle argumente avec lui. En outre, 32% d'hommes pensent qu'il est justifié qu'un mari batte sa femme lorsqu'elle néglige les enfants.

Six femmes de 15-49 ans sur dix (61%) actuellement en union peuvent refuser des rapports sexuels à leur mari quand elles ne souhaitent pas en avoir.




VIOLENCE DOMESTIQUE

1. Expérience générale de violence physique




Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant subi des actes de violence physique de la part de n'importe quel auteur depuis l'âge de 15 ans.

2. Expérience de violence physique pendant la grossesse




Pourcentage femmes de 15–49 ans ayant subi des actes de violence physique au cours d'une grossesse

3. Expérience de violence sexuelle à un moment quelconque



Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant subi des actes de violence sexuelle à un moment quelconque de la part de n'importe quel auteur au cours des 12 mois.


4. Comportement de contrôle du mari



Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari qui ont déjà manifesté des types spécifiques de comportements de contrôle




5. Violence du partenaire intime



Pourcentage de femmes de 15–49 ans ayant déjà eu un mari ou un partenaire intime qui ont subi des actes de violence émotionnelle, physique ou sexuelle de la part de leur mari/partenaire intime

6. Recherche d'aide pour arrêter la violence



Répartition (en %) des femmes de 15–49 ans qui ont subi des actes de violence physique ou sexuelle selon qu'elles ont recherché ou non de l'aide

Près de 3 de femmes de 15–49 ans sur 10 (28%) ont subi des actes de violence physique de la part de n'importe quel auteur depuis l'âge de 15 ans.

Moins d'1 femme sur 10 (3%) de 15–49 ans ont subi des actes de violence physique au cours d'une grossesse.

Près de la moitié des femmes (45%) de 15–49 ans ont déjà eu un mari qui est jaloux ou en colère lorsqu'elle parle avec d'autres hommes. Par ailleurs, 29% de femmes du même groupe d'âges ont un mari qui cherche à savoir à tout moment où elle se trouve.

32% des femmes de 15–49 ans ont déjà été victimes des actes de violence physique ou sexuelle de la part de leur mari ou partenaire intime; 30% des femmes du même groupe d'âges l'ont déjà été pour des actes de violence physique. Cependant, 35% de ces femmes ont subi au moins un acte de violence physique ou sexuelle ou émotionnelle.


Un peu plus d'1 femme de 15–49 ans sur 20 (7%) ont subi des actes de violence sexuelle à un moment quelconque de sa vie de la part de n'importe quel auteur et 2% les ont subis au cours des 12 derniers mois.

Parmi les femmes de 15–49 ans qui ont subi des actes de violence physique ou sexuelle, un peu plus d'une femme sur dix (14%) ont recherché de l'aide pour l'arrêter; 13% n'ont jamais recherché de l'aide mais en ont parlé à quelqu'un, et 72% n'ont jamais recherché de l'aide et n'en ont jamais parlé à quelqu'un.




SITUATION DES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS

1. Enfants orphelins et résidence des enfants avec les parents




% d'enfants de moins de 18 ans (population de droit) par état de survie des parents et résidence avec les parents

3. Fréquentation scolaire au primaire




Taux Net de Fréquentation scolaire (TNF), de la population de fait de 6-11 ans.

6. Travail dangereux




Pourcentage d'enfants de 5-17 ans (population de droit) ayant travaillé dans des conditions dangereuses

2. Enregistrement de naissances




Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans (population de droit) dont la naissance a été enregistrée à l'état civil

4. Participation dans des activités d'apprentissage organisées



Pourcentage d'enfants plus jeunes d'un an que l'âge officiel d'entrée en cycle primaire (au début de l'année scolaire) qui fréquentent un programme d'éducation préscolaire ou l'école primaire (TNA).

5. Travail des enfants



Pourcentage d'enfants de 5-17 ans impliqués dans des activités économiques ou des tâches domestiques et % impliqué dans le travail des enfants.



Parmi les enfants de moins de 18 ans, (48%) vivent avec leurs deux parents ; (19%) vivent avec aucun parent biologique et (7%) ont un ou les deux parents décédés.


65% des naissances des enfants de moins 5 ans sont enregistrées à l'état civil.

Les taux nets de fréquentation scolaire au primaire sont de 79% chez les filles et de 81% chez les garçons.

83% des enfants d'un an plus jeune que l'âge officiel d'entrée à l'école primaire, fréquentent un programme d'éducation préscolaire ou l'école primaire.

Parmi les enfants de 5 à 17 ans, 3% ont été impliqués dans des activités économiques, 3% dans des tâches domestiques et 5% dans le travail des enfants.


Un enfant de 5-17 ans sur 20 (5%) ont travaillé dans des conditions dangereuses durant les deux semaines ayant précédé l'enquête.






MALADIES CHRONIQUES ET AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ

1. Niveaux de tension artérielle chez les femmes et les hommes




Prévalence de l'hypertension artérielle

3. Couverture médicale




Pourcentage de femmes et des hommes de 15-49 ans ayant n'importe quel type d'assurance médicale

2. Prévalence du Diabète sucré chez les femmes et les hommes




Prévalence du diabète sucré

4. Consommation de tabac sous n'importe quelle forme



Pourcentage des femmes et des hommes de 15-49 ans qui fument du tabac sous différentes formes

5. Consommation d'alcool



Pourcentage des femmes et des hommes de 15-49 ans ayant consommé de l'alcool chaque jour ou presque chaque jour





La prévalence de l'hypertension artérielle est de 10% chez les femmes et de 12% chez les hommes de 15-49 exæquo.

La prévalence du diabète sucré est de 8% chez les femmes et de 7% chez les hommes de 15-49 ans.

11% des femmes et 12% des hommes de 15-49 ans ont une assurance médicale.

1% des femmes et 22% des hommes de 15-49 ans consomment actuellement n'importe quel type de tabac.

9% des femmes et 15% des hommes de 15-49 ans consomment de l'alcool chaque jour ou presque chaque jour.