

ສປປ ລາວ 2023



ການສຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ

HIV & ພຶດຕິກຳທາງເພດ


ຕົວຊີ້ບອກ HIV




ຄວາມຮູ້

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ທີ່ຮູ້ສອງວິທີຂອງການປ້ອງກັນໂລກເອດສ (ມີຄູ່ນອນທີ່ຊິສັດຜູ້ດຽວທີ່ບໍ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງເວລາມີເພດສຳພັນ), ຜູ້ທີ່ຮູ້ວ່າ ຄົນທີ່ເບິ່ງຄືມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ອາດເປັນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້, ແລະ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ 2 ປະການ.

ແມ່ຍິງ



ຜູ້ຊາຍ




ຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນ

- ແມ່ຍິງ 2 ໃນ 10 ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 15-49 ປີ (20%) ຮູ້ສອງວິທີການປ້ອງກັນພະຍາດເອດສ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຮູ້ຂອງຜູ້ຊາຍແມ່ນສູງກວ່າເລັກນ້ອຍ; ຢູ່ທີ່ 23%.
- ເກືອບ 1 ໃນ 5 ຜູ້ຊາຍໜຸ່ມ (18%), ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຍິງໜຸ່ມ (20%) ອາຍຸ 15-24 ປີ, ຮູ້ສອງວິທີຂອງການປ້ອງກັນໂລກເອດສ.
- ເກືອບ 1 ໃນ 2 ແມ່ຍິງ (49%) ແລະ ຜູ້ຊາຍ (52%) ອາຍຸ 15-49 ປີລາຍງານວ່າມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ບໍ່ຕິຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອດສ.
- ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-24 ປີ ແລະ ອາຍຸ 15-49 ປີ ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດ HIV ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ຮູ້ຜົນກວດແມ່ນ 1.2% ແລະ 1% ຕາມລຳດັບ. ພຽງແຕ່ 0.3% ຂອງທັງສອງກຸ່ມອາຍຸ, 15-24 ແລະ 49 ປີ, ລາຍງານວ່າພວກເຂົາໄດ້ກວດ HIV ໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຮູ້ຜົນກວດ.
- 6% ຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ໃນໄລຍະທີ່ມາຮັບການບໍລິການດູແລກ່ອນເກີດ ສຳລັບການຖືພາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ກວດເອສໄອວີ, ໄດ້ຍອມຮັບເຮັດການກວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກວດ, ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຸຂະສິກສາ ຫຼື ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບເອສໄອວີ ຫຼັງຈາກກວດ.


ການຈຳແນກລັງກຽດ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ທີ່ລາຍງານວ່າມີທັດສະນະທີ່ຈຳແນກຕໍ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ ລວມທັງ 1) ຈະບໍ່ຊື່ຜັກສິດຈາກເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຫຼື ຜູ້ຂາຍທີ່ຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ ແລະ 2) ຄິດວ່າເດັກນ້ອຍທີ່ຕິດເຊື້ອເອສໄອວີບໍ່ຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍທີ່ບໍ່ຕິດເຊື້ອ HIV

ອາຍຸ 15-49




ອາຍຸ 15-49




ການກວດ HIV

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ກວດ HIV ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ຮູ້ຜົນກວດ

ອາຍຸ 15-49




ອາຍຸ 15-49



ການກວດ HIV ໃນເວລາດູແລກ່ອນເກີດ


ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງໃນເວລາມາຮັບການບໍລິການດູແລກ່ອນເກີດ ໃນໄລຍະທີ່ຖືພາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ກວດເອສໄອວີ, ໄດ້ຍອມຮັບກວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກວດ, ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຸຂະສິກສາ ຫຼື ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບເອສໄອວີ ຫຼັງຈາກກວດ.

ອາຍຸ 15-49




ຕົວຊີ້ບອກ HIV ຕາມລັກສະນະຕ່າງໆ

ຄວາມຮູ້ໃນກຸ່ມເດັກໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ຍິງໝຸ່ມ (15-24)*



ຄວາມຮູ້ໃນກຸ່ມເດັກໄວຈະເລີນພັນຊາຍ ແລະ ຊາຍໝຸ່ມ (15-24)*




*ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົນທີ່ມີ ອາຍຸ 15-24 ປີ ຜູ້ທີ່ຮູ້ສອງວິທີຂອງການປ້ອງກັນໂລກເອດສ, ຜູ້ທີ່ຮູ້ວ່າ ຄົນທີ່ເບິ່ງຄືເປັນຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ອາດເປັນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້, ແລະ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ 2 ປະການ..

ຕົວເລກຂັ້ນແຂວງກ່ຽວກັບການກວດ HIV

ແຂວງ	ຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ກວດ HIV ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ	ຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ກວດ HIV ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ	ແມ່ຍິງທີ່ໄດ້ກວດ HIV ໃນເວລາມາກວດກ່ອນເກີດໃນໄລຍະຖືພາ
ລະດັບຊາດ	0	1	6
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ	1	2	30
ຜົ້ງສາລີ	0	0	0
ຫຼວງນ້ຳທາ	2	2	1
ອຸດົມໄຊ	1	1	1
ບໍ່ແກ້ວ	0	1	1
ຫຼວງພະບາງ	1	1	5
ຫົວພັນ	0	1	2
ໄຊຍະບູລີ	0	1	13
ຊຽງຂວາງ	1	3	7
ວຽງຈັນ	0	1	1
ບໍລິຄຳໄຊ	0	1	3
ຄຳມ່ວນ	0	1	1
ສະຫວັນນະເຂດ	0	1	6
ສາລະວັນ	0	0	2
ເຊກອງ	0	2	11
ຈຳປາສັກ	0	1	6
ອັດຕະປື	0	1	1
ໄຊສົມບູນ	0	0	0

ການກວດ HIV ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ



ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຄົນອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ໄດ້ກວດ HIV ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ຮູ້ຜົນກວດ, ແຍກຕາມກຸ່ມອາຍຸ

ການກວດ HIV ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ໄດ້ກວດ HIV ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະ ຮູ້ຜົນກວດ.


ການກວດ HIV ໃນເວລາມາກວດກ່ອນເກີດໃນໄລຍະຖືພາ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ໃນເວລາມາຮັບການບໍລິການດູແລ່ກ່ອນເກີດ ໃນໄລຍະຖືພາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ກວດເອສໄອວີ, ໄດ້ຍອມຮັບກວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກວດ, ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຸຂະສິກສາ ຫຼື ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບເອສໄອວີ ຫຼັງຈາກກວດ.

ຂໍ້ຄວາມທີ່ສຳຄັນ

- ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງແມ່ຍິງໝຸ່ມ (45%) ແລະ ຊາຍໝຸ່ມ (47%) ອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາສູງສຸດສອງວິທີປ້ອງກັນໂລກເອດສ, ພວກເຂົາ ຮູ້ວ່າຄົນທີ່ເບິ່ງຄືມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ອາດເປັນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIV ໄດ້, ແລະ ປະຕິເສດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ 2 ປະການ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພົບວ່າແມ່ຍິງໝຸ່ມ (6%) ແລະ ຜູ້ຊາຍໝຸ່ມ (5%) ທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາ ແມ່ນມີຄວາມຮູ້ດຽວກັນ.
- ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີທີ່ໄດ້ກວດ HIV ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜ່ານມາ ແມ່ນສູງກວ່າ ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ກວດ.
- 3 ແຂວງອັນດັບຕົ້ນໆ ທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍສູງສຸດ ຂອງແມ່ຍິງ ອາຍຸ 15-49 ປີ ໃນເວລາມາຮັບການບໍລິການດູແລ່ກ່ອນເກີດ ໃນໄລຍະຖືພາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ກວດເອສໄອວີ, ໄດ້ຍອມຮັບກວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກວດ, ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຸຂະສິກສາ ຫຼື ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບເອສໄອວີ ຫຼັງຈາກກວດ ແມ່ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (30%), ໄຊຍະບູລີ (13%) ແລະ ເຊກອງ (11%).
- ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່າສຸດຂອງແມ່ຍິງ ອາຍຸ 15-49 ປີ ໃນເວລາມາຮັບການບໍລິການດູແລ່ກ່ອນເກີດ ໃນໄລຍະຖືພາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ກວດເອສໄອວີ, ໄດ້ຍອມຮັບກວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກວດ, ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຸຂະສິກສາ ຫຼື ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບເອສໄອວີ ຫຼັງຈາກກວດ ແມ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີ (0.3%), ໄຊສົມບູນ (0.3%) ແລະ ອັດຕະປື (0.7%).


ພຶດຕິກຳທາງເພດ ຕາມລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ

ມີເພດສຳພັນ




ຢູ່ໃນຫຼາຍໆສະຖານະການ, ພຶດຕິກຳທາງເພດສາມາດຖືວ່າເປັນປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມ. ຊຶ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, HIV ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອື່ນໆ, ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮູບແບບພຶດຕິກຳທາງເພດຂອງປະຊາກອນສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ.

ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍຄົນ





ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ



ມີເພດສຳພັນ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15-24 ແລະ 15-49 ປີ ທີ່ມີການຮ່ວມເພດພາຍໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍຄົນ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15-24 ແລະ 15-49 ປີ ທີ່ມີເພດສຳພັນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ອາຍຸ 15-24 ປີ ແລະ 15-49 ປີ ທີ່ມີຄູ່ຮ່ວມເພດສຳພັນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນເວລາມີເພດສຳພັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ.
ມີເພດສຳພັນກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15-24 ປີທີ່ມີເພດສຳພັນກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ.
ມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນອາຍຸ 15-19 ປີທີ່ມີເພດສຳພັນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ມີເພດສຳພັນກັບຜູ້ຊາຍອາຍຸ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
 * () ຕົວເລກທີ່ອີງໃສ່ 25-49 ກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ຖ່ວງນ້ຳຫນັກ.

ໄວໜຸ່ມທີ່ມີເພດສຳພັນກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ




ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ

- 76% ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 79% ຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ມີອາຍຸ 15-49 ປີ ແມ່ນມີເພດສຳພັນພາຍໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
- 52% ຂອງແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ 49% ຂອງຜູ້ຊາຍໄວຈະເລີນພັນ ອາຍຸ 15-24 ປີ ແມ່ນມີເພດສຳພັນພາຍໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
- ປະມານ 4% ຂອງຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15-24 ປີ ແລະ 4% ຂອງຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15-49 ປີ ມີເພດສຳພັນກັບຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
- 61% ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 61% ຂອງຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີເພດສຳພັນ. ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມແມ່ນຕໍ່າກວ່າ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-49 ປີ (ຜູ້ຊາຍ 44%, ແມ່ຍິງ 46%).
- 3% ຂອງຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ລາຍງານວ່າເຄີຍຮ່ວມເພດກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ.
- 9% ຂອງເດັກຍິງໄວຈະເລີນພັນ ອາຍຸ 15-19 ປີ ລາຍງານວ່າ ຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງເຂົາເຈົ້າມີອາຍຸ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
- 6% ຂອງແມ່ຍິງໜຸ່ມ (61%) ແລະ ຜູ້ຊາຍໜຸ່ມ 9% ຂອງເດັກຍິງໄວຈະເລີນພັນ ອາຍຸ 15-19 ປີ ທີ່ລາຍງານວ່າ ຄູ່ຮ່ວມເພດກັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 10 ປີ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.


ພຶດຕິກຳທາງເພດ ຕາມລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ

ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນໄວໜຸ່ມ

ໄວຈະເລີນພັນຊາຍ 15-19 ປີ




ຊາຍໜຸ່ມ 20-24 ປີ



ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ລາຍງານວ່າມີການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ເວລາມີເພດສຳພັນຄັ້ງ ຫຼ້າສຸດ.

* () ຕົວເລກທີ່ອີງໃສ່ 25-49 ກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ຖ່ວງນ້ຳຫນັກ

ມີເພດສຳພັນກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ໃນໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະ ຍິງໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ



ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກຍິງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ຍິງໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ທີ່ມີເພດສຳພັນກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ

ການສຳຫຼວດດັດສະນີໜ້າຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ III (LSIS III) ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ປີ 2023 ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສຳຫຼວດນີ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ໂຄງການການສຳຫຼວດ ແມ່ ແລະ ເດັກ (MICS) ສາກົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບເດັກ (UNICEF). ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ອົງການ UNICEF, ອົງການ USAID, EUD, ລັດຖະບານອິດສະຕາລີ, ລັດຖະບານລຸກຊຳບວກ ແລະ

ອົງການ UNFPA.

ຈຸດປະສົງໃນການກິດຈະກຳນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫຼວດທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ຈາກການເຮັດການສຳຫຼວດຂອງ MICS ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2023 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ HIV & ພຶດຕິກຳທາງເພດ. ຂໍ້ມູນຈາກການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ TM.10.1M, TM.10.1W, TM.10.2M, TM.10.2W, TM.11.1M, TM.11.1W, TM.11.3M, TM.11.3W, TM.11.4M, TM.11.4W,

ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມກັບຄູ່ຮ່ວມເພດທີ່ບໍ່ປະຈຳໃນໄວໜຸ່ມ

ເດັກຊາຍໄວໜຸ່ມແລະຊາຍໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ

ເດັກຍິງໄວໜຸ່ມແລະຍິງໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ



ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີທີ່ໄດ້ລາຍງານການໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມໃນເວລາມີເພດສຳພັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດກັບຄູ່ຮ່ວມເພດທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານ, ບໍ່ຢູ່ຮ່ວມກັນໃນ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ຕົວເລກຂັ້ນແຂວງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳທາງເພດ

ໄວຈະເລີນພັນຊາຍ ແລະ ຊາຍໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ

ໄວຈະເລີນພັນຍິງ ແລະ ຍິງໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ

ແຂວງ	ມີເພດສຳພັນກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ	ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫລາຍຄົນ	ມີເພດສຳພັນກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ	ມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫລາຍຄົນ
ລະດັບຊາດ	3	4	6	1
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ	0	1	1	1
ຜົ້ງສາລີ	4	2	9	1
ຫຼວງນ້ຳທາ	14	12	9	0
ອຸດົມໄຊ	6	7	6	0
ບໍ່ແກ້ວ	2	4	7	1
ຫຼວງພະບາງ	6	17	8	1
ຫົວພັນ	12	2	11	0
ໄຊຍະບູລີ	1	3	11	0
ຊຽງຂວາງ	4	12	8	0
ວຽງຈັນ	2	4	7	1
ບໍລິຄຳໄຊ	3	3	8	1
ຄຳມ່ວນ	1	1	4	1
ສະຫວັນນະເຂດ	1	1	5	1
ສາລະວັນ	0	1	5	0
ເຊກອງ	1	3	7	1
ຈຳປາສັກ	0	1	2	0
ອັດຕະປື	2	3	3	0
ໄຊສົມບູນ	1	1	11	0

ມີເພດສຳພັນກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ໄວໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີທີ່ມີການຮ່ວມເພດກ່ອນອາຍຸ 15 ປີ ມີເພດສຳພັນກັບຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ໄວໜຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີທີ່ມີເພດສຳພັນຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ.

TM.11.5, TM.11.6M and TM.11.6W ຂອງບົດລາຍງານການສຳຫຼວດສະບັບສົມບູນ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ສະບັບອື່ນໆ ແລະ ບົດລາຍງານການສະຫຼວດສະບັບສົມບູນ ທີ່ເວັບໄຊ mics.unicef.org/surveys, www.unicef.org/laos, ແລະ www.lsb.gov.la