


Reducciones notables en países con mortalidad elevada

Cambios en países con el mayor número de muertes a causa del tétanos neonatal en 1990



Fuente: OMS, 2000.

Meta


La eliminación del tétanos neonatal* para 1995

» Tétanos neonatal



Progresos en la eliminación del tétanos neonatal, 1990-2000

Se han evitado más de un millón de muertes infantiles



Fuente: OMS/UNICEF, 2001.


Resultados

Para 2000, 104 de 161 países en desarrollo habían logrado eliminar el tétanos neonatal. Otros 22 estaban muy cerca de esa meta. Durante el decenio de 1990, las muertes causadas por el tétanos neonatal disminuyeron de 470.000 a 215.000 debido al aumento de la protección del toxoide tetánico y a las prácticas más higiénicas en los alumbramientos.

... pero

El tétanos materno y neonatal aún representa un grave problema sanitario en 57 países en desarrollo. Mediante la inmunización con tres dosis de la vacuna del toxoide tetánico de las mujeres en edad de procrear que habitan en las regiones de alto riesgo se inmuniza a las mujeres y a sus lactantes. Esa es la clave para eliminar el tétanos materno y neonatal para 2005.

El 73% de las muertes por tétanos neonatal estimadas en el mundo en desarrollo se producen en 8 países



Fuente: OMS, 2000.

Problema

El tétanos neonatal es una enfermedad prevenible, y con frecuencia mortal, resultado de prácticas antihigiénicas durante el alumbramiento, que exponen el cordón umbilical a las bacterias del tétanos. La enfermedad es más frecuente en los países donde el acceso a los servicios básicos de salud es deficiente debido a la pobreza y a las limitaciones culturales y geográficas.

*La reducción de los casos de tétanos neonatal a menos de uno por 1.000 nacidos vivos en todas las provincias de todos los países.