

LE NIGER EN CHIFFRES

DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES

Démographie	Population Totale	13 millions (Enquête BCR 2005)
	Taux de croissance démographique	3.3% (Enquête BCR 2005)
	Indice de fécondité	7.1 enfants/femme (EDS-MICS 2006)
	Espérance de vie	54,8 ans (Recensement de 2001)
	Taux de la population vivant en milieu rural	83.7% (Recensement de 2001)
	Taux de la population totale ayant moins de 15 ans	47.6% (Enquête BCR 2005)
Economie	Taux de la population vivant avec moins d'1\$ par jour	62.1% (Enquête QUIBB 2005)

MORTALITE INFANTILE

Mortalité infantile	Taux de mortalité infanto-juvénile (<5 ans)	198/1.000 naissances vivantes (EDS-MICS 2006)
	Taux de mortalité infantile (<1 an)	81/1.000 naissances vivantes (EDS-MICS 2006)

NUTRITION

Statut nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes	Prévalence des retards de croissance (malnutrition chronique : Taille / Age)	50 % (EDS-MICS 2006)
	Prévalence de l'émaciation (malnutrition aiguë globale : Poids / Taille)	10.3 % (EDS-MICS 2006)
	Prévalence de l'insuffisance pondérale (Poids / Age)	44% (EDS-MICS 2006)
	Prévalence de l'anémie chez les enfants de moins de 6 à 59 mois	86.8% (EDS-MICS 2006)
	Prévalence des faibles poids de naissance (Poids à la naissance <2500 g)	20.5% (EDS-MICS 2006)
Allaitement maternel	Taux d'allaitement exclusif pendant les six premiers mois de vie	2.4% (Enquête GoN/UNICEF/PAM 2006)
	Allaitement commencé à temps (dans l'heure suivant la naissance)	48.3% (EDS-MICS 2006)
Iodation du sel	Ménages disposant de sel adéquatement iodé	46% (EDS-MICS 2006)
Vitamine A	Supplémentation en vitamine A (enfants de moins de 5 ans)	70% (EDS-MICS 2006)
	Supplémentation en vitamine A (femmes en post-partum)	22% (EDS-MICS 2006)

SANTE DE L'ENFANT

Vaccination	Enfants de 12 à 23 mois vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3)	39.3 % (EDS-MICS 2006)
	Couverture vaccinale de la rougeole	47 % (EDS-MICS 2006)
	Enfants entièrement vaccinés avant 12 mois contre les six maladies cibles du PEV	29% (EDS-MICS 2006)
Paludisme	Disponibilité de moustiquaires imprégnées (MI) par ménage	46% (EDS-MICS 2006)
	Enfants de moins de 5 ans dormant sous une MI	15% (EDS-MICS 2006)

SANTE DE LA REPRODUCTION

Mortalité maternelle	Taux de mortalité maternelle	648/100.000 naissances vivantes (EDS-MICS 2006)
Santé maternelle et néonatale	Soins prénatals dispensés par du personnel formé	46% (EDS-MICS 2006)
	Accouchement dans un établissement de santé	17% (EDS-MICS 2006)

ENVIRONNEMENT

Eau	Accès à une source d'eau potable (milieu urbain)	93% (EDS-MICS 2006)
	Accès à une source d'eau potable (milieu rural)	30% (EDS-MICS 2006)
Assainissement	Accès à un système d'assainissement (milieu urbain)	38.4% (EDS-MICS 2006)

LE NIGER EN CHIFFRES

EDUCATION		
Education	Taux brut de scolarisation au primaire	57.1% (Annuaire Statistique Education 2006/2007)
	Taux brut de scolarisation au primaire (filles)	47.4% (Annuaire Statistique Education 2006/2007)
	Taux brut de scolarisation au primaire (garçons)	66.7% (Annuaire Statistique Education 2006/2007)
	Taux brut de pré scolarisation (garçons et filles)	1.6% (Annuaire Statistique Education 2006/2007)
	Taux d'analphabétisme des femmes (15-24 ans)	88.4% (EDS-MICS 2006)
	Taux d'analphabétisme des hommes (15-24 ans)	72.2% (EDS-MICS 2006)
PROTECTION DE L'ENFANT		
Enregistrement des naissances	Enregistrement à la naissance	32% (EDS-MICS 2006)
Travail des enfants	Enfants entre 5 et 14 ans qui travaillent:	38% (EDS-MICS 2006)
Mariage précoce	Mariage avant 15 ans (filles)	59% (Enquête BCR 2005)
Excision	Femmes de 15 à 49 ans victimes d'excision	2.2% (EDS-MICS 2006)
VIH/SIDA, COMPORTEMENT SEXUEL, ENFANTS ORPHELINS ET VULNERABLES		
Connaissances et comportements face au VIH/SIDA	Jeunes femmes (15-24 ans) ayant une connaissance « complète » sur la prévention du VIH/SIDA	13% (EDS-MICS 2006)
	Jeunes hommes (15-24 ans) ayant une connaissance « complète » sur la prévention du VIH/SIDA	16% (EDS-MICS 2006)
	Jeunes femmes (15-24 ans) ayant subi le test de dépistage du VIH	1% (EDS-MICS 2006)
	Jeunes hommes (15-24 ans) ayant subi le test du dépistage du VIH	2% (EDS-MICS 2006)
	Femmes adoptant un comportement tolérant à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA	5% (EDS-MICS 2006)
	Hommes adoptant un comportement tolérant à l'égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA	11% (EDS-MICS 2006)
	Connaissances sur la transmission de la mère à l'enfant du VIH/SIDA pendant la grossesse chez les femmes	57% (EDS-MICS 2006)
	Connaissances sur la transmission de la mère à l'enfant du VIH/SIDA pendant la grossesse chez les hommes	71% (EDS-MICS 2006)
Séroprévalence du VIH/SIDA	Adultes séropositifs (15-49 ans)	0.7% (EDS-MICS 2006)
	Femmes en âge de procréer séropositives	0.7% (EDS-MICS 2006)
Comportement sexuel chez les jeunes 15-24 ans	Utilisation des préservatifs au cours des premiers rapports sexuels chez les jeunes femmes	2% (EDS-MICS 2006)
	Utilisation des préservatifs au cours des premiers rapports sexuels chez les jeunes hommes	14% (EDS-MICS 2006)
	Jeunes femmes ayant eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	30% (EDS-MICS 2006)
	Jeunes hommes ayant eu leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans	5% (EDS-MICS 2006)
	Jeunes femmes connaissant un endroit où se procurer des condoms	9% (EDS-MICS 2006)
	Jeunes hommes connaissant un endroit où se procurer des condoms	28% (EDS-MICS 2006)
Soutien aux Enfants orphelins	Prévalence d'orphelins (deux parents décédés)	0.5% (EDS-MICS 2006)